

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

**Многопрофильный колледж**



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
ЕН.01 МАТЕМАТИКА  
программы подготовки специалистов среднего звена  
по специальности СПО  
46.02.01 Документационное обеспечение управления и  
архивоведение**

базовой подготовки

Магнитогорск, 2018

## **ОДОБРЕНО**

Предметной комиссией  
Математических и  
естественнонаучных дисциплин  
Председатель: Е.С. Корытникова  
Протокол № 6 от 21.02.2018 г.

Методической комиссией

Протокол № 4 от 01.03.2018 г

## **Разработчик**

*Ю.Н.Садчикова*

преподаватель МпК ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»

Методические указания по выполнению практических работ разработаны на основе рабочей программы учебной дисциплины «Математика».

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Методические указания.....	5
Практическая работа 1.....	5
Практическая работа 2-3.....	7
Практическая работа 4.....	11
Практическая работа 5-6.....	12
Практическая работа 7.....	16
Практическая работа 8.....	18
Практическая работа 9.....	20
Практическая работа 10-11.....	23
Практическая работа 12-13.....	26
Практическая работа 14.....	29
Практическая работа 15-16.....	31
Практическая работа 17.....	34
Практическая работа 18.....	37
Практическая работа 19.....	40
Практическая работа 20-21.....	43
Практическая работа 22-23.....	45
Практическая работа 24.....	50

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки студентов составляют практические занятия. Являясь частью изучения учебной дисциплины, они призваны, экспериментально подтвердить теоретические положения и формировать общие и профессиональные компетенции, практические умения.

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических умений - профессиональных (умений выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности), необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным дисциплинам.

Состав и содержание практических работ направлены на реализацию действующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.

В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Математика» предусмотрено проведение практических работ.

В результате их выполнения, обучающийся должен:

*уметь:*

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших порядков;
- применять основные методы интегрирования при решении задач;
- применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том числе профессиональной направленности.

Содержание практических работ ориентировано на подготовку студентов к освоению профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы по специальности. А также формированию общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Выполнение студентами практических работ по учебной дисциплине «Математика» направлено на:

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- формирование и развитие умений: наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков;

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;

## 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

### Тема 1.1. Производная и ее приложение

#### Практическое занятие № 1

#### Вычисление производных функций по правилам дифференцирования

**Цель работы:** научить вычислять производные элементарных и сложных функций, учить проводить исследование функции и строить ее график .

**Выполнив работу, Вы будете:**

**Уметь:** вычислять производные элементарных и сложных функций, используя правила и формулы дифференцирования, проводить исследование функции и строить ее график.

**Материальное обеспечение:**

Тетрадь с конспектом, таблица «Правила и формулы дифференцирования», таблица «Полное исследование функции и построение графика», карточки-задания для выполнения индивидуальных работ, таблица с ответами для преподавателя.

**Задание 1.** Найти производную функции

**Задание 2.** Провести полное исследование функции и построить ее график

**Порядок выполнения работы:**

1. Повторение правил и формул

2. Объяснение преподавателя
3. Оценка выполненных заданий
4. Подведение итогов.

### Ход работы:

#### 1. Повторение правил и формул

Дайте определение производной функции.

Сформулируйте общее правило нахождения производной функции.

Какая связь существует между непрерывностью функции и ее производной?

Чему равна производная постоянной?

Чему равна производная аргумента?

Как вычисляется алгебраической суммы функций, произведения и частного функций?

Какая функция называется сложной?

Как вычисляется производная сложной функции?

#### 1. Объяснение преподавателя

#### Задание . Найти производные функций

Задания	Пояснения
1. $(x^{10})' = 10x^{10-1} = 10x^9$	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
2. $(\frac{5}{x^{11}})' = (5 \cdot x^{-11})' = 5(x^{-11})' = 5(-11)x^{-11-1} = -55x^{-12}$	$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ ; $(cx)' = c(x)'$ ; $(x^n)' = nx^{n-1}$
3. $(2x^{10} - x^8 + 3x^3)' = (2x^{10})' - (x^8)' + (3x^3)'$ $= 2(x^{10})' - (x^8)' + 3(x^3)' = 2 \cdot 10x^9 - 8x^7 + 9x^2$	$(u+v)' = u' + v'$ ; $(cx)' = c(x)'$
4. $Y = (7x^4 - 2x + 3)^5$ ; $Y' = u^5$ , где $u = 7x^4 - 2x + 3$ ; $y' = 5u^4 \cdot u'$ ; $y' = 5(7x^4 - 2x + 3)^4 \cdot (7x^4 - 2x + 3)'$ ; $y' = 5(7x^4 - 2x + 3)^4 \cdot (28x^3 - 2)$ . Найти $y'_x$ при $x = 0$ ; $y'_0 = 5 \cdot 3^4 \cdot (-2) = -810$	<i>Воспользуемся формулой</i> $(u^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$ ; где $n = 5$ $(cx^n)' = c(x^n)'$ ; $(c)' = 0$
5. $((x+1) \cdot \sqrt{x})' = (x+1)' \cdot \sqrt{x} + (x+1)(\sqrt{x})' = \sqrt{x} + (x+1) \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ $(u + v)' = u' + v'$

	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $(x)' = 1$
6.	$((2x - 7)^{14})' = 14(2x - 7)^{13}(2x - 7)' =$ $y' = f'(u) \cdot u'$ $(u^n)' = nu^{n-1}.$

### 1. Оценка выполненных заданий

Форма предоставления результата: выполненные задания

### 2. Подведение итогов

Составление таблицы «Полное исследование функции и построение графиков»

**Форма представления результата:** выполненное задание.

### Критерии оценки:

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## Тема 1.1. Производная и ее приложение

### Практическое занятие № 2-3

#### Вычисление производных сложных функций

**Цель работы:** научить вычислять производные элементарных и сложных функций, учить проводить исследование функции и строить ее график.

**Выполнив работу, Вы будете:**

**Уметь:** вычислять производные элементарных и сложных функций, используя правила и формулы дифференцирования, проводить исследование функции и строить ее график.

### Материальное обеспечение:

Тетрадь с конспектом, таблица «Правила и формулы дифференцирования», таблица «Полное исследование функции и построение графика», карточки-задания для выполнения индивидуальных работ, таблица с ответами для преподавателя.

**Задание:** 1. Найти производную функции

**Задание2.** Провести полное исследование функции и построить ее график

### Порядок выполнения работы:

7. Повторение правил и формул
8. Объяснение преподавателя
9. Оценка выполненных заданий
10. Подведение итогов.

### Ход работы:

#### 1. Повторение правил и формул

Дайте определение производной функции.

Сформулируйте общее правило нахождения производной функции.

Какая связь существует между непрерывностью функции и ее производной?

Чему равна производная постоянной?

Чему равна производная аргумента?

Как вычисляется алгебраической суммы функций, произведения и частного функций?

Какая функция называется сложной?

Как вычисляется производная сложной функции?

#### 1. Объяснение преподавателя

##### Задание:

1. Найти производные функций.

### Краткие теоретические сведения:

#### Правила дифференцирования

Пусть  $c$  – постоянная,  $u=u(x)$ ,  $v=v(x)$  – дифференцируемые функции. Тогда

1.  $c' = 0$ ;

2.  $(u \pm v)' = u' \pm v'$ ;

3.  $(uv)' = u'v + uv'$ ;

5.  $(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$ ;

6.  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ ,  $v(x) \neq 0$ ;

7.  $\left(\frac{c}{v}\right)' = \frac{cv'}{v^2}$ ,  $v(x) \neq 0$ .



$$4. \quad (cu)' = cu';$$

Пусть  $y=f(u)$  и  $u=u(x)$  – дифференцируемые функции и определена сложная функция  $y=f(u(x))$ . Тогда сложная функция дифференцируема и равна произведению производной функции  $y=f(u)$  в точке  $u=u(x)$  и производной функции  $u=u(x)$  в точке  $x$ , т.е.  $y' = f'(u) \cdot u'$ .

Если  $y=f(x)$  – дифференцируемая и строго монотонная функция на промежутке  $X$ , то функция, обратная к данной  $x=\varphi(y)$ , также дифференцируема и ее производная определяется соотношением:

$$x'_y = \frac{1}{y'_x}, \quad y'_x \neq 0.$$

Логарифмической производной функции  $y=f(x)$  называется производная от логарифма этой функции, т.е.  $(\ln y)' = \frac{y'}{y} = \frac{f'(x)}{f(x)}$ .

Дифференцирование функций, т.е. вычисление их производных, выполняется с использованием сформулированных правил дифференцирования и формул дифференцирования.

### Формулы дифференцирования

Таблица 1

№	Основные элементарные ф-ии	Сложные функции
1	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(u^n)' = nu^{n-1}u'$
2	$(e^x)' = e^x$	$(e^u)' = e^u u'$
3	$(a^x)' = a^x \ln a$	$(a^u)' = a^u \ln a u'$
4	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\ln u)' = \frac{1}{u} u' = \frac{u'}{u}$
5	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln a} u' = \frac{u'}{u \ln a}$
6	$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin u)' = \cos u u'$
7	$(\cos x)' = -\sin x$	$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$
8	$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	$(\operatorname{tg} u)' = \frac{1}{\cos^2 u} u' = \frac{u'}{\cos^2 u}$
9	$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	$(\operatorname{ctg} u)' = -\frac{1}{\sin^2 u} u' = -\frac{u'}{\sin^2 u}$

10	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} u' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
----	-------------------------------------	---

**Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

**Ход работы:**

1. Найдите  $y'''$  от следующих функций

1) $y = (mx^k + 4)^p$	2) $y = m * \cos(px^k - m)$
3) $y = (e^{px^m} + kx)$	4) $y = ktg(mx^p)$
5) $y = 12^{px^m - mx}$	6) $y = ctg(px^k - mx)$
7) $y = \ln(x^k + px^m)$	8) $y = \sqrt{mp^x + kx}$
9) $y = \log_7(mx + k)$	10) $y = (e^{px+k}) * \sqrt{x^p + mx}$
11) $y = p * \sin(kx + m)$	12) $y = \frac{\ln(px^n)}{k * \cos mx}$

Где  $p$  – число букв в имени  
 $m$  – число букв в фамилии  
 $k$  – число букв отчества

2. Найти производные  $x'_y$  обратных функций: а)  $y = x - \cos x$ ;

б)  $y = 2x + x^3$ ;

в)  $y = 2^x \ln(1 - \sqrt{x})$ .

3. Найти производные функций: а)  $y = e^{\sin 2x}$ ;

б)  $y = \left( \frac{1+x^2}{x^2+x} \right)^3$ ;

в)  $y = 5 \log_{10}(4x-2)$ .

4. Результат работы оформить в виде отчета.

### 3. Оценка выполненных заданий

Форма предоставления результата: выполненные задания

### 4. Подведение итогов

Составление таблицы «Полное исследование функции и построение графиков»

**Форма представления результата:** выполненное задание.

#### Критерии оценки:

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## Тема 1.1. Производная и ее приложение

### Практическое занятие № 4

#### Вычисление производных высших порядков

#### Цель работы:

формирование умений вычислять производные и дифференциалы высших порядков; вычислять пределы по правилу Лопиталья.

#### Выполнив работу, Вы будете:

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

#### Материальное обеспечение:

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

### Задание:

1. Найти производные, используя правило Лопиталю.

### Краткие теоретические сведения:

*Производной второго порядка*, или второй производной, функции  $f(x)$  называется производная от ее первой производной. Обозначается вторая производная одним из символов  $y''$ ,  $f''(x)$ ,  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

Производная  $n$ -го порядка  $y^{(n)}$  функции  $y=f(x)$  определяется по индукции:  $y^{(n)} = (y^{(n-1)})'$ . Обозначается:  $y^{(n)}$ ,  $f^{(n)}(x)$ ,  $\frac{d^n y}{dx^n}$ .

Пример. Найти производную 4-го порядка от функции  $y = \sin 2x$ .

Решение. Последовательно дифференцируя функцию, получим:  $y' = 2\cos 2x$ ;  $y'' = -4\sin 2x$ ;  $y''' = -8\cos 2x$ ;  $y^{(4)} = 16\sin 2x$ .

*Правило Лопиталю* состоит в следующем. Предел отношения двух бесконечно малых или бесконечно больших функций равен пределу отношения их производных (конечному или бесконечному), если последний существует в указанном смысле:  $\lim_{x \rightarrow x_0(\infty)} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0(\infty)} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ .

Таким образом, правило Лопиталю используется для раскрытия неопределенностей вида  $\left(\frac{0}{0}\right)$  или  $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ .

### Понятие дифференциала функции

Пусть функция  $y=f(x)$  определена на промежутке  $X$  и дифференцируема в некоторой окрестности точки  $x \in X$ . Тогда существует конечная производная  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$ .

На основании теоремы о связи бесконечно малых величин с пределами функций можно записать  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha(\Delta x)$ , где  $\alpha(\Delta x)$  – бесконечно малая величина при  $\Delta x \rightarrow 0$ , откуда  $\Delta y = f'(x) \cdot \Delta x + \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x$ .

Таким образом, приращение функции  $\Delta y$  состоит из двух слагаемых: 1) линейного относительно  $\Delta x$ ; 2) нелинейного (представляющего бесконечно малую более высокого порядка, чем  $\Delta x$ ).

*Дифференциалом функции* называется главная, линейная относительно  $\Delta x$  часть приращения функции, равная произведению производной на приращение независимой переменной:  $dy = f'(x) \cdot \Delta x$ .

Пример. Найти приращение и дифференциал функции  $y = 2x^2 - 3x$  при  $x=10$  и  $\Delta x = 0,1$ .

Решение. Приращение функции

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = [2 \cdot (x + \Delta x)^2 - 3 \cdot (x + \Delta x)] = \Delta x \cdot (4x + 2\Delta x - 3).$$

Дифференциал функции  $dy = f'(x) \cdot \Delta x = (4x - 3) \cdot \Delta x$ .

При  $x=10$  и  $\Delta x = 0,1$  имеем  $\Delta y = 3,72$  и  $dy=3,70$ .

*Дифференциал независимой переменной* равен приращению этой переменной:  $dx = \Delta x$ .

Поэтому формулу для дифференцирования функции можно записать в виде  $dy = f'(x) \cdot dx$ .

*Свойства дифференциала* в основном аналогичны свойствам производной.

- |    |                          |    |   |
|----|--------------------------|----|---|
| 1. | $dc=0$ , где $c=const$ . | 4. | $d(uv)=v du+u dv$ .                                   |
| 2. | $d(cu)=c du$ .           | 5. | $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}$ |
| 3. | $d(u \pm v)=du \pm dv$ . |    |   |

*Применение дифференциала в приближенных вычислениях*

Из изложенного выше следует, что приращение функции  $\Delta y$  отличается от её дифференциала  $dy$  на бесконечно малую величину более высокого порядка, чем  $dy = f'(x) \cdot \Delta x$ . Поэтому при достаточно малых значениях  $\Delta x$   $\Delta y \approx dy$  или  $f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x) \cdot \Delta x$ , откуда  $f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \cdot \Delta x$ .

Чем меньше значение  $\Delta x$ , тем точнее формула.

Данную формулу можно использовать для вычисления приближенных значений некоторых выражений, например: а) вычисление корня  $n$ -й степени; б) возведение числа в  $n$ -ю степень; в) вычисление значения тригонометрической функции, и т.д.

Пример. Вычислить приближенно  $\sqrt[4]{16,64}$ .

Решение. Рассматривая выше записанную формулу  $f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \cdot \Delta x$ , в качестве  $x$  возьмём число, наиболее близкое к 16,64, но чтобы был известен  $\sqrt[4]{x}$ , при этом  $\Delta x$  должно быть достаточно малым. Очевидно, следует взять  $x=16$ ,  $\Delta x = 0,64$ .

Итак,  $\sqrt[4]{16,64} \approx \sqrt[4]{16} + \frac{\sqrt[4]{16}}{4 \cdot 16} \cdot 0,64 = 2,02$ .

**Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

**Ход работы:**

1. Найти пределы, используя правило Лопиталя:

а)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \ln(1+x)}{x}$ ;

б)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}$ ;

в)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\ln(e^{x^2} + 1)}$ .

2. Найти производные 2-го порядка функций:

а)  $y = x^3 - 4x^2 + 5x - 1$ ;

б)  $y = x^2 \sqrt{1-x^2}$ ;

в)  $y = x \ln(x+1)$ .

3. Вычислить приближенно:

а)  $\sqrt{1,1}$ ;

б)  $e^{-0,1}$ .

3. Результат работы оформить в виде отчета.

**Форма представления результата:**

Представить выполненные задания в тетради для практических работ преподавателю.

**Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## Тема 1.1. Производная и ее приложение

### Практическое занятие №5-6

#### «Вычисление производных различных функций по правилам дифференцирования»

##### Цель работы:

формирование умений вычислять производные различных функций по правилам дифференцирования

##### Выполнив работу, Вы будете:

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности.

##### Материальное обеспечение:

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

##### Задание:

1 Вычислить производные различных функций по правилам дифференцирования

1) $y = (mx^k + 4)^p$	2) $y = m * \cos(px^k - m)$
3) $y = (e^{px^m} + kx)$	4) $y = ktg(mx^p)$
5) $y = 12^{px^m - mx}$	6) $y = ctg(px^k - mx)$
7) $y = \ln(x^k + px^m)$	8) $y = \sqrt{mp^x + kx}$
9) $y = \log_7(mx + k)$	10) $y = (e^{px+k}) * \sqrt{x^p + mx}$
11) $y = p * \sin(kx + m)$	12) $y = \frac{\ln(px^n)}{k * \cos mx}$

**Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

**Форма представления результата:**

Результат должен быть представлен в виде письменного отчета с указанием даты, номера занятия, темы и хода выполнения работы.

**Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

**Тема 1.1. Производная и ее приложение**  
**Практическое занятие № 7****Исследование функций и схематичное построение графиков****Цель работы:**

научиться исследовать функции с помощью дифференциального исчисления.

**Выполнив работу, Вы будете:**

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

**Материальное обеспечение:**

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.



**Задание:**

1. Исследовать функцию и построить схематичный график.

$$1. f(x) = x^4 - 2x^2 + 2; \quad 8. f(x) = x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 1;$$

$$2. f(x) = -x^4 + 8x^2 - 16; \quad 9. f(x) = 4x^4 - 2x^2 + 3;$$

$$3. f(x) = x^4 - 10x^2 + 9; \quad 10. f(x) = 3x^4 - 4x^3;$$

$$4. f(x) = x^4 - 2x^2 + 2; \quad 11. f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2;$$

$$5. f(x) = 6x^4 - 4x^6; \quad 12. f(x) = -\frac{x^4}{4} + x^2;$$

$$6. f(x) = 4x^5 - 5x^4; \quad 13. f(x) = 2x^4 - x^2 + 1;$$

$$7. f(x) = x^4 - 8x^2 + 5; \quad 14. f(x) = 4x^4 - 8x^2 + 1;$$

**Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

**Ход работы:**

1. Исследуйте функцию на монотонность и экстремум

а)  $y = x^5 - 5x$

б)  $f(x) = \ln x$

в)  $y = x^3 - x - 6$

г)  $y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2$

д)  $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x$

9. Результат работы оформить в виде отчета.

**Форма представления результата:**

Результат должен быть представлен в виде письменного отчета с указанием даты, номера занятия, темы и хода выполнения работы.

**Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## Тема 1.1. Производная и ее приложение

### Практическое занятие №8

#### Исследование функций с учётом выпуклости и точек перегиба и схематичное построение их графиков. Использование графиков в профессиональной деятельности

##### Цель работы:

формирование умений исследовать функцию и строить ее график.

##### Выполнив работу, Вы будете:

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

##### Материальное обеспечение:

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

##### Задание:

1. Исследовать функцию и построить график.

1) $y = \frac{x^2+3}{x-1}$ ;	2) $y = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ ;
3) $y = \frac{x^2-1}{x^2}$ ;	4) $y = \frac{x^2-1}{x}$ ;
5) $y = \frac{1-x^2}{x^2}$ ;	6) $y = \frac{x}{x^2+1}$ ;
7) $y = \frac{1}{x-2}$ ;	8) $y = \frac{x}{x^2-1}$ ;
9) $y = \frac{1-x^2}{x^2-4}$ ;	10) $y = \frac{x^2-1}{x^2-2x+2}$ ;
11) $y = \frac{(x-3)^2}{x^2}$ ;	12) $y = \frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$ ;

13)  $y = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$ ;

14)  $y = \frac{x^4+1}{x^2}$ .

**Краткие теоретические сведения:**

*Схема исследования функции  $y = f(x)$  на экстремум:*

- 1) найти производную  $y' = f'(x)$ ;
- 2) найти критические точки функции, в которых производная равна нулю или не существует;
- 3) исследовать знак производной слева и справа от каждой критической точки и сделать вывод о наличии экстремумов функции;
- 4) найти экстремальные значения функции.

*Схема исследования функции  $y = f(x)$  на выпуклость и точки перегиба:*

- 1) найти вторую производную функции  $f''(x)$ ;
- 2) найти точки, в которых вторая производная  $f''(x) = 0$  или не существует;
- 3) исследовать знак второй производной слева и справа от найденных точек и сделать вывод об интервалах выпуклости и наличии точек перегиба;
- 4) найти значения функции в точках перегиба.

*Общая схема исследования функций и построения графиков:*

- 1) найти область определения функции;
- 2) исследовать функцию на четность – нечетность;
- 3) найти вертикальные асимптоты;
- 4) исследовать поведение функции в бесконечности; найти горизонтальные и наклонные асимптоты;
- 5) найти экстремумы и интервалы монотонности функции;
- 6) найти интервалы выпуклости функции и точки перегиба;
- 7) найти точки пересечения графика функции с осями координат и, возможно, некоторые дополнительные точки, уточняющие график.

**Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

**Ход работы:**

1. Найти интервалы возрастания и убывания, а также точки экстремума следующих функций:

а)  $y = (x-1)^2(x-4)$ ;

б)  $y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x^2 + 2x + 2}$ .

2. Исследовать функции и построить их график:

а)  $y = \frac{2x}{1-x^2}$ ;

б)  $y = x \ln x$ .

3. Результат работы оформить в виде отчета.

### **Форма представления результата:**

Представить выполненные задания в тетради для практических работ преподавателю.

### **Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## **Практическое занятие № 9** **Вычисление неопределенных интегралов методом** **непосредственного интегрирования**

### **Цель работы:**

Научиться вычислять неопределенные интегралы непосредственным интегрированием и методом замены переменной.

### **Выполнив работу, Вы будете:**

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

**Материальное обеспечение:**

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

**Задание:**

1. Найти интеграл методом непосредственного интегрирования, методом замены переменной.

**Краткие теоретические сведения:**

*Свойства неопределенного интеграла:*

1) производная от неопределенного интеграла равна подынтегральной функции, т.е.  $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$ ;

2) дифференциал неопределенного интеграла равен подынтегральному выражению, т.е.  $d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx$ ;

3) неопределенный интеграл от дифференциала некоторой функции равен этой функции с точностью до постоянного слагаемого, т.е.  $\int dF(x) = F(x) + C$  где  $C$  – произвольное число;

4) постоянный множитель можно выносить за знак интеграла, т.е.  $\int \alpha f(x)dx = \alpha \int f(x)dx$ , где  $\alpha$  – некоторое число;

5) интеграл от алгебраической суммы двух функций равен такой же сумме интегралов от этих функций, т.е.  $\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$ .

*Таблица неопределенных интегралов*

1.  $\int 0dx = C$ ;

9.  $\int \cos x dx = \sin x + C$ ;

2.  $\int dx = x + C$ ;

10.  $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctg \frac{x}{a} + C, a \neq 0$ ;

3.  $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$ ;

11.  $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, a \neq 0$ ;

4.  $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$ ;

12.  $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$ ,

$$-a < x < a, a > 0;$$

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C;$$

$$13. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a} \right| + C, a \neq 0;$$

$$6. \int \frac{dx}{x+a} = \ln|x+a| + C;$$

$$14. \int e^x dx = e^x + C;$$

$$7. \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$15. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C;$$

$$8. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, a > 0, a \neq 1;$$

$$16. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C.$$

*Метод замены переменной*

Пусть  $x = \varphi(t)$  – функция, непрерывно дифференцируемая на рассматриваемом промежутке. Тогда  $\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$ .

Эта формула называется *формулой замены переменной* в неопределенном интеграле.

**Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

**Ход работы:**

1. Найдите неопределенный интеграл методом непосредственного интегрирования:

а)  $\int (x^2 - 8x + 2) dx$

б)  $\int 7^x dx$

в)  $\int (3^x - \cos x) dx$

г)  $\int \frac{x^2-1}{x+1} dx$

д)  $\int (x + 6)^2 dx$

2. Найдите неопределенный интеграл методом замены переменной:

а)  $\int (x^2 - 8x + 2) dx$

б)  $\int 7^x dx$

в)  $\int (3^x - \cos x) dx$

г)  $\int \frac{x^2-1}{x+1} dx$

д)  $\int (x + 6)^2 dx$

5. Результат работы оформить в виде отчета.

**Форма представления результата:**

Представить выполненные задания в тетради для практических работ преподавателю.

**Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

**Практическое занятие № 10-11**

**Вычисление неопределенных интегралов методом замены переменной**

**Цель работы:**

Научиться вычислять неопределенные интегралы непосредственным интегрированием и методом замены переменной.

**Выполнив работу, Вы будете:**

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

**Материальное обеспечение:**

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

**Задание:**

1. Найти интеграл методом непосредственного интегрирования, методом замены переменной.

**Краткие теоретические сведения:**

*Свойства неопределенного интеграла:*

6) производная от неопределенного интеграла равна подынтегральной функции, т.е.  $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$ ;

7) дифференциал неопределенного интеграла равен подынтегральному выражению, т.е.  $d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx$ ;

8) неопределенный интеграл от дифференциала некоторой функции равен этой функции с точностью до постоянного слагаемого, т.е.  $\int dF(x) = F(x) + C$  где  $C$  – произвольное число;

9) постоянный множитель можно выносить за знак интеграла, т.е.  $\int \alpha f(x)dx = \alpha \int f(x)dx$ , где  $\alpha$  – некоторое число;

10) интеграл от алгебраической суммы двух функций равен такой же сумме интегралов от этих функций, т.е.  $\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$ .

*Таблица неопределенных интегралов*

9.  $\int 0dx = C$ ;

17.  $\int \cos x dx = \sin x + C$ ;

10.  $\int dx = x + C$ ;

18.  $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, a \neq 0$ ;

11.  $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$ ;

19.  $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, a \neq 0$ ;

12.  $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$ ;

20.  $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C,$   
 $-a < x < a, a > 0$ ;

13.  $\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C$ ;

21.  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a} \right| + C, a \neq 0$ ;

14.  $\int \frac{dx}{x+a} = \ln|x+a| + C$ ;

22.  $\int e^x dx = e^x + C$ ;

15.  $\int \sin x dx = -\cos x + C$ ;

23.  $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$ ;



$$16. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, a > 0, a \neq 1; \quad 24. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -ctgx + C.$$

*Метод замены переменной*

Пусть  $x = \varphi(t)$  – функция, непрерывно дифференцируемая на рассматриваемом промежутке. Тогда  $\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$ .

Эта формула называется *формулой замены переменной* в неопределенном интеграле.

**Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

**Ход работы:**

1. Найдите неопределенный интеграл методом непосредственного интегрирования:

а)  $\int (x^2 - 8x + 2)dx$

б)  $\int 7^x dx$

в)  $\int (3^x - \cos x)dx$

г)  $\int \frac{x^2-1}{x+1} dx$

д)  $\int (x + 6)^2 dx$

2. Найдите неопределенный интеграл методом замены переменной:

а)  $\int (x^2 - 8x + 2)dx$

б)  $\int 7^x dx$

в)  $\int (3^x - \cos x)dx$

г)  $\int \frac{x^2-1}{x+1} dx$

д)  $\int (x + 6)^2 dx$

5. Результат работы оформить в виде отчета.

**Форма представления результата:**

Представить выполненные задания в тетради для практических работ преподавателю.

**Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном

объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## **Тема 1.2. Интегральное исчисление функций одной переменной**

### **Тема 1.2. Интегральное исчисление функций одной переменной**

#### **Практическое занятие № 12-13**

#### **Вычисление неопределённых интегралов по частям**

##### **Цель работы:**

формирование умений находить неопределённые интегралы методами замены переменной и по частям.

##### **Выполнив работу, Вы будете:**

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

##### **Материальное обеспечение:**

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

##### **Задание:**

1. Найти неопределённый интеграл.

##### **Краткие теоретические сведения:**

*Свойства неопределённого интеграла:*

11) производная от неопределенного интеграла равна подынтегральной функции, т.е.  $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$ ;

12) дифференциал неопределенного интеграла равен подынтегральному выражению, т.е.  $d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx$ ;

13) неопределенный интеграл от дифференциала некоторой функции равен этой функции с точностью до постоянного слагаемого, т.е.

$$\int dF(x) = F(x) + C \text{ где } C - \text{ произвольное число};$$

14) постоянный множитель можно выносить за знак интеграла, т.е.

$$\int \alpha f(x)dx = \alpha \int f(x)dx, \text{ где } \alpha - \text{ некоторое число};$$

15) интеграл от алгебраической суммы двух функций равен такой же сумме интегралов от этих функций, т.е.

$$\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$$

*Таблица неопределенных интегралов*

$$17. \int 0 dx = C;$$

$$25. \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$18. \int dx = x + C;$$

$$26. \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, a \neq 0;$$

$$19. \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1; \quad 27. \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, a \neq 0;$$

$$20. \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C;$$

$$28. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, \\ -a < x < a, a > 0;$$

$$21. \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C;$$

$$29. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a} \right| + C, a \neq 0;$$

$$22. \int \frac{dx}{x+a} = \ln|x+a| + C;$$

$$30. \int e^x dx = e^x + C;$$

$$23. \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$31. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C;$$

$$24. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, a > 0, a \neq 1;$$

$$32. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C.$$

*Метод замены переменной*

Пусть  $x = \varphi(t)$  – функция, непрерывно дифференцируемая на рассматриваемом промежутке. Тогда  $\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$ .

Эта формула называется *формулой замены переменной* в неопределенном интеграле.

*Метод интегрирования по частям*

Пусть  $u = u(x)$  и  $v = v(x)$  – непрерывно дифференцируемые функции. Тогда справедлива формула:  $\int u dv = uv - \int v du$ .

Эта формула называется *формулой интегрирования по частям*.

### **Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

### **Ход работы:**

1. Найти неопределенные интегралы, используя метод замены переменной:

а)  $\int \frac{dx}{e^{2x-1}}$ ;

б)  $\int \frac{dx}{(4x+3)^5}$ ;

в)  $\int \frac{dx}{\sqrt{2-x}}$ ;

г)  $\int \sqrt[5]{3x+2} dx$ .

2. Найти неопределенные интегралы, используя метод интегрирования по частям:

а)  $\int xe^{5x} dx$ ;

б)  $\int \ln(1-x) dx$ ;

в)  $\int x \sin 3x dx$ .

3. Результат работы оформить в виде отчета.

### **Форма представления результата:**

Представить выполненные задания в тетради для практических работ преподавателю.

**Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## **Тема 1.2. Интегральное исчисление функций одной переменной**

### **Практическое занятие № 14 Вычисление определенных интегралов методом непосредственного интегрирования**

**Цель работы:**

формирование умений вычислять определенные интегралы.

**Выполнив работу, Вы будете:**

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

**Материальное обеспечение:**

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

**Задание:**

1. Найти определенный интеграл.

**Краткие теоретические сведения:**

*Свойства определенного интеграла:*

$$1) \int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx, \text{ где } \alpha - \text{некоторое число};$$

$$2) \int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx;$$

$$3) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx;$$

$$4) \int_a^a \alpha f(x) dx = 0;$$

$$5) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

*Формула Ньютона–Лейбница*

Определенный интеграл от непрерывной на отрезке  $[a; b]$  функции  $f(x)$  равен приращению любой ее первообразной  $F(x)$  на этом отрезке:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b.$$

*Замена переменной в определенном интеграле*

Если функция  $\varphi(t)$  имеет непрерывную производную на отрезке  $[\alpha; \beta]$ ,  $a = \varphi(\alpha)$ ,  $b = \varphi(\beta)$  и функция  $f(x)$  непрерывна в каждой точке

$$x = \varphi(t), \text{ где } t \in [\alpha; \beta], \text{ то } \int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

*Интегрирование по частям определенного интеграла*

Если функции  $u = u(x)$  и  $v = v(x)$  имеют непрерывные производные на отрезке  $[a; b]$ , то  $\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du.$

**Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

**Ход работы:**

1. Найти определенные интегралы:

а)  $\int_4^5 x\sqrt{x^2-16}dx;$

б)  $\int_1^e x \ln x dx ;$

в)  $\int_1^5 \frac{xdx}{\sqrt{1+3x}}.$

3. Результат работы оформить в виде отчета.

### **Форма представления результата:**

Представить выполненные задания в тетради для практических работ преподавателю.

### **Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## **Практическое занятие № 15-16**

### **Вычисление определенных интегралов методом замены переменной**

#### **Цель работы:**

формирование умений вычислять определенные интегралы.

#### **Выполнив работу, Вы будете:**

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

**Материальное обеспечение:**

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

**Задание:**

1. Найти определенный интеграл.

$$\int_4^5 x\sqrt{x^2 - 16} dx;$$

б)  $\int_1^e x \ln x dx$ ;

в)  $\int_1^5 \frac{x dx}{\sqrt{1 + 3x}}$ .

**Краткие теоретические сведения:**

*Свойства определенного интеграла:*

6)  $\int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$ , где  $\alpha$  – некоторое число;

7)  $\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$ ;

8)  $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$ ;

9)  $\int_a^a \alpha f(x) dx = 0$ ;

10)  $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ .

*Формула Ньютона–Лейбница*



Определенный интеграл от непрерывной на отрезке  $[a; b]$  функции  $f(x)$  равен приращению любой ее первообразной  $F(x)$  на этом отрезке:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b.$$

*Замена переменной в определенном интеграле*

Если функция  $\varphi(t)$  имеет непрерывную производную на отрезке  $[\alpha; \beta]$ ,  $a = \varphi(\alpha)$ ,  $b = \varphi(\beta)$  и функция  $f(x)$  непрерывна в каждой точке

$$x = \varphi(t), \text{ где } t \in [\alpha; \beta], \text{ то } \int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

*Интегрирование по частям определенного интеграла*

Если функции  $u = u(x)$  и  $v = v(x)$  имеют непрерывные производные на отрезке  $[a; b]$ , то  $\int_a^b u dv = uv\Big|_a^b - \int_a^b v du$ .

### **Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

### **Ход работы:**

2. Найти определенные интегралы:

а)  $\int_4^5 x\sqrt{x^2 - 16}dx;$

б)  $\int_1^e x \ln x dx;$

в)  $\int_1^5 \frac{x dx}{\sqrt{1+3x}}.$

3. Результат работы оформить в виде отчета.

### **Форма представления результата:**

Представить выполненные задания в тетради для практических работ преподавателю.

### **Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## Тема 1.2. Интегральное исчисление функций одной переменной

### Практическое занятие 17 Приложения определённого интеграла

#### Цель работы:

формирование умений вычислять определенные интегралы.

#### Выполнив работу, Вы будете:

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

#### Материальное обеспечение:

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

#### Задание:

Вычислить интегралы используя метод подстановки	Вычислять интегралы используя метод интегрирования по частям
1) $\int (3 + 5x)^4 dx;$	1) $\int x \sin x dx;$
2) $\int \frac{dx}{(2x+1)^2};$	2) $\int \frac{\ln x dx}{x^2};$
3) $\int \sqrt{x+2} dx;$	3) $\int \ln^2 x dx;$
4) $\int \frac{3dx}{\sqrt[3]{3x+5}};$	4) $\int (2x-1) \cdot e^{3x} dx;$

5) $\int \frac{dx}{\cos^2(1-2x)}$ ;	5) $\int x \cdot 2^x dx$ ;
6) $\int_0^1 \sqrt{1-x} dx$ ;	6) $\int x \operatorname{arctg} x dx$ ;
7) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{3x+1}}$ ;	7) $\int x^5 e^{x^2} dx$ ;
8) $\int_0^3 \frac{2x dx}{\sqrt{16+x^2}}$ ;	8) $\int (x+1)e^x dx$ ;
9) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{1+\sin x}$ ;	9) $\int (2x+3) \cos x dx$ ;
10) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} e^{\cos x} \sin x dx$ .	10) $\int e^{2x} \cos x dx$ .

### Краткие теоретические сведения:

Свойства определенного интеграла:

$$11) \int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx, \text{ где } \alpha - \text{некоторое число};$$

$$12) \int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx;$$

$$13) \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx;$$

$$14) \int_a^a \alpha f(x) dx = 0;$$

$$15) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

*Формула Ньютона–Лейбница*

Определенный интеграл от непрерывной на отрезке  $[a; b]$  функции  $f(x)$  равен приращению любой ее первообразной  $F(x)$  на этом отрезке:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b.$$

*Замена переменной в определенном интеграле*

Если функция  $\varphi(t)$  имеет непрерывную производную на отрезке  $[\alpha; \beta]$ ,  $a = \varphi(\alpha)$ ,  $b = \varphi(\beta)$  и функция  $f(x)$  непрерывна в каждой точке

$$x = \varphi(t), \text{ где } t \in [\alpha; \beta], \text{ то } \int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

*Интегрирование по частям определенного интеграла*

Если функции  $u = u(x)$  и  $v = v(x)$  имеют непрерывные производные на отрезке  $[a; b]$ , то  $\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$ .

### Порядок выполнения работы:

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

### Ход работы:

Вычислить интегралы используя метод подстановки	Вычислять интегралы используя метод интегрирования по частям
11) $\int (3 + 5x)^4 dx;$	11) $\int x \sin x dx;$
12) $\int \frac{dx}{(3x+1)^2};$	12) $\int \frac{\ln x dx}{x^2};$
13) $\int \sqrt{x+2} dx;$	13) $\int \ln^2 x dx;$
14) $\int \frac{3dx}{\sqrt{3x+5}};$	14) $\int (2x-1) \cdot e^{3x} dx;$
15) $\int \frac{dx}{\cos^2(1-2x)};$	15) $\int x \cdot 2^x dx;$
16) $\int_0^1 \sqrt{1-x} dx;$	16) $\int x \operatorname{arctg} x dx;$
17) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{3x+1}};$	17) $\int x^5 e^{x^2} dx;$
18) $\int_0^3 \frac{2x dx}{\sqrt{16+x^2}};$	18) $\int (x+1)e^x dx;$
19) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{1+\sin x};$	19) $\int (2x+3) \cos x dx;$
20) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} e^{\cos x} \sin x dx.$	20) $\int e^{2x} \cos x dx.$

### Форма представления результата:

Представить выполненные задания в тетради для практических работ преподавателю.

### Критерии оценки:

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## **Тема 1.2. Интегральное исчисление функций одной переменной**

### **Практическое занятие №18**

#### **Решение прикладных задач с использованием определенного интеграла.**

##### **Цель работы:**

формирование умений находить площади плоских фигур с помощью определенных интегралов

##### **Выполнив работу, Вы будете:**

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

##### **Материальное обеспечение:**

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

##### **Задание:**

1. Найти площади плоских фигур.

а)  $y = x^2$ ,  $y = \frac{1}{x}$ ,  $x = 3$ ,  $y = 0$ ;

б)  $y = 2x - x^2$ ,  $x = 3$ ,  $y = 0$ .

### Краткие теоретические сведения:

#### Геометрический смысл определенного интеграла

Пусть функция  $y = f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a; b]$  и принимает на этом отрезке неотрицательные значения, т.е.  $f(x) > 0$  при  $x \in [a; b]$ . Фигура, образованная линиями  $x = a$ ,  $x = b$ ,  $y = 0$ ,  $y = f(x)$ , называется криволинейной трапецией (рис. 1). Определенный интеграл от неотрицательной функции имеет простой геометрический смысл: это площадь криволинейной трапеции.



Рис. 1

#### Площади плоских фигур

1. Если функция  $f(x)$  неотрицательна на отрезке  $[a; b]$ , то площадь  $S$  под кривой  $y = f(x)$  на  $[a; b]$  (рис. 2) численно равна определенному

интегралу от  $f(x)$  на данном отрезке:  $S = \int_a^b f(x) dx$  (геометрический смысл определенного интеграла).




Рис. 2

2. Если функция  $f(x)$  – неположительна на отрезке  $[a; b]$ , то площадь  $S$  под кривой  $y = f(x)$  на  $[a; b]$  (рис. 3) равна определенному интегралу

от  $f(x)$  на  $[a; b]$ , взятому со знаком «минус»:  $S = -\int_a^b f(x) dx$ .




Рис. 3

3. Если функция  $f_2(x) \geq f_1(x)$  на отрезке  $[a; b]$ , то площадь  $S$  фигуры, заключенной между кривыми  $y = f_2(x)$  и  $y = f_1(x)$  на  $[a; b]$  (рис. 4)

определяется формулой  $S = \int_a^b (f_2(x) - f_1(x)) dx$ .




Рис. 4

**Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.
3. Предоставить результат выполнения.

**Ход работы:**

1. Найти площади плоских фигур, ограниченных линиями:

а)  $y = x^2$ ,  $y = \frac{1}{x}$ ,  $x = 3$ ,  $y = 0$ ;

б)  $y = 2x - x^2$ ,  $x = 3$ ,  $y = 0$ .

2. Результат работы оформить в виде отчета.

**Форма представления результата:**

Представить выполненные задания в тетради для практических работ преподавателю.

**Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работы не

позволяет сделать правильных выводов.

### Тема 1.3 Дифференциальные уравнения

#### Практическое занятие №19

#### Решение дифференциальных уравнений первого порядка

##### Цель работы:

формирование умений решать дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными; решать линейные дифференциальные уравнений 1-го порядка.

##### Выполнив работу, Вы будете:

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

##### Материальное обеспечение:

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

##### Задание:

1. Решить дифференциальные уравнения.

1.  $ds = (4t - 3)dt$ , если при  $t=0$   $s=0$ .

2.  $dx = (2t^2 - 5)dt$ , если при  $t=1$   $x=-4$ .

3.  $x dx = dy$ , если при  $x=1$   $y=0$ .

4.  $x dx = y dy$ , если при  $x=2$   $y=1$ .

5.  $x^2 dx + y dy = 0$ , если при  $x=0$   $y=1$ .

6.  $(t - 1)dt + s ds = 0$ , если при  $t=2$   $s=0$ .

7.  $\frac{2 dy}{y} - \frac{dx}{x} = 0$ , если при  $x=1$   $y = \sqrt{2}$ .

8.  $\frac{dy}{2x} + \frac{dx}{y} = 0$ , если при  $x=0$   $y=2$ .

##### Краткие теоретические сведения:

*Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными*



Дифференциальное уравнение первого порядка называется уравнением с *разделяющимися переменными*, если оно может быть представлено в виде:  $f(x)dx = g(y)dy$ .

Решается такое уравнение почленным интегрированием данного равенства.

*Однородные дифференциальные уравнения первого порядка*

Дифференциальное уравнение первого порядка называется *однородным*, если оно может быть представлено в виде:  $y' = g\left(\frac{y}{x}\right)$ .

Замена переменной  $z = \frac{y}{x}$ , где  $z = z(x)$ , сводит однородные дифференциальные уравнения к уравнениям с разделяющимися переменными.

*Линейные дифференциальные уравнения первого порядка*

Дифференциальное уравнение первого порядка называется *линейным*, если оно имеет вид:  $y' + f(x)y = g(x)$ , где  $f(x)$ ,  $g(x)$  – некоторые непрерывные функции переменной  $x$ . Если функция  $g(x)$  тождественно равна нулю, то уравнение называется *однородным*, в противном случае – *неоднородным*.

Один из способов решения такого уравнения, предложенный Даламбером, – представить неизвестную функцию в виде  $y = u \cdot v$ . Тогда  $y' = u'v + uv'$  и дифференциальное уравнение запишется в виде  $u'v + uv' + f(x)uv = g(x)$  или  $u'v + u[v' + f(x)v] = g(x)$ .

Если функцию  $v$  выбрать так, что будет выполняться равенство  $v' + f(x)v = 0$ , то относительно другой функции  $u$  дифференциальное уравнение будет простым:  $vu' = g(x)$ . Таким образом, решение исходного дифференциального уравнения (3) распадается на решение двух дифференциальных уравнений: сначала  $v' + f(x)v = 0$ , а затем  $vu' = g(x)$ .

Дифференциальное уравнение первого порядка называется *уравнением Бернулли*, если оно имеет вид:  $y' + f(x)y = g(x)y^n$ , где  $n \neq 0$ ,  $n \neq 1$ .

Это уравнение приводится к линейному с помощью подстановки  $z = y^{1-n}$  либо может быть непосредственно решено тем же методом, что и линейные уравнения.

### **Порядок выполнения работы:**

1. Получить задание.
2. Выполнить задание.

3. Предоставить результат выполнения.

**Ход работы:**

1. Найти частное решение дифференциального уравнения:

а)  $2s \, dt = t \, ds$ , если при  $t=1 \, s=2$ .

б)  $x^2 \, dy - y^2 \, dx = 0$ , если при  $x=0,2 \, y=1$

2. Найдите общий интеграл дифференциального уравнения.

а)  $y' = tg \, x \, tg \, y$

$$y \, dx + (1 - y)x \, dy = 0.$$

б)  $x^2 y' - 2xy = 3y$ .

4. Результат работы оформить в виде отчета.

**Форма представления результата:**

Представить выполненные задания в тетради для практических работ преподавателю.

**Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## Тема 1.3. Дифференциальные уравнения

### Практическое занятие № 20-21

#### Однородные дифференциальные уравнения.

##### Цель работы:

формирование умений решать однородные дифференциальные уравнений 1-го порядка;

##### Выполнив работу, Вы будете:

уметь:

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

##### Материальное обеспечение:

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

##### Задание:

1. Решить однородные дифференциальные уравнения.

26.  $(xy + x) \frac{dx}{dy} = 1.$

27.  $(xy^2 + x)dx + (x^2 - y)dy = 0.$

28.  $(y - x^2y)dy + (x + xy^2) dx = 0.$

29.  $(1 + x^2)dy - (xy + x)dx = 0.$

30.  $y dx + (1 - y)x dy = 0.$

31.  $x^2 dy + (y - 1)dx = 0.$

32.  $2(xy + e)dx = x dy.$

33.  $(x^2 + 1)dy = y dx.$

34.  $x^2 y' - 2xy = 3y.$

##### Порядок выполнения работы:

- 1) Привести данное уравнение к уравнению с разделяющимися переменными, т. е. произвести разделение переменных, для этого:
  - а) Производные функции заменить её дифференциалами;
  - б) Сгруппировать члены с одинаковыми дифференциалами и записать их в разных частях равенства, вынеся дифференциалы за скобки;
  - в) Поделить или умножить обе части равенства на такие выражения, чтобы все функции стояли при „своих” дифференциалах, т. е. привести к виду:  $\varphi(y)dy = \varphi(x)dx$
- 2) Проинтегрировать обе части равенства и найти общее решение.
- 3) Для выделения частного решения из общего задается точка  $(x_0; y_0)$ , через которую должна проходить интегральная кривая. Находим значение постоянной  $C$ , а затем  $C$  подставляем в общее решение и записываем частное решение.

### Ход работы:

1) Найти общее решение дифференциального уравнения:

$$(6x dx + 3xy^2 dx) - (6y dy + 2x^2 y dy) = 0$$

Сгруппируем члены с  $dx$  и  $dy$

$$3x(2 + y^2) dx - 2y(3 + x^2) dy = 0$$

-Разделим переменные

$$\frac{3x dx}{3 + x^2} = \frac{2y dy}{2 + y^2}$$

-Интегрируем

$$3 \int \frac{x dx}{3 + x^2} = 2 \int \frac{y dy}{2 + y^2}$$

-Решаем по отдельности каждый интеграл методом подстановки

$$\frac{3}{2} \ln(3 + x^2) = \ln(2 + y^2) + \ln c$$

$$\ln(3 + x^2)^{\frac{3}{2}} = \ln(2 + y^2) \cdot c$$

-Потенцируем это уравнение

$$\sqrt{(3 + x^2)^3} = (2 + y^2) \cdot c$$

-Записываем общее решение:

$$\frac{(3 + x^2)\sqrt{3 + x^2}}{2 + y^2} = c$$

2) Найти частные решение дифференциальных уравнений

$$2(y - 3) dx - dy = 0 \text{ при } x=0, y=4$$

-Разделим переменные

$$dy = 2(y - 3) dx$$

$$\frac{dy}{y - 3} = 2 dx$$

-Проинтегрируем обе части уравнения

$$\int \frac{dy}{y - 3} = \int 2 dx$$

$$\ln(y - 3) = 2x + \ln c$$

-По определению логарифма  $2x = \ln e^{2x}$

$$\ln(y - 3) = \ln(e^{2x} \cdot c)$$

-Запишем общее решение

$$y = e^{2x} \cdot c + 3$$

-Подставим в это уравнение начальные условия  $x=0, y=4$

$$4 = e^0 \cdot c + 3 \Rightarrow c = 1$$

-Запишем частное решение

$$y = e^{2x} + 3$$

**Форма представления результата:** выполненное задание.

### **Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## **Тема 1.3 Дифференциальные уравнения**

### **Практическое занятие № 22-23**

#### **Решение прикладных задач с применением дифференциальных уравнений первого порядка**

##### **Цель работы:**

формирование умений решать дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделяющимися переменными; решать однородные дифференциальные уравнений 1-го порядка; решать линейные дифференциальные уравнений 1-го порядка.

##### **Выполнив работу, Вы будете:**

*уметь:*

- применять математические знания и умения при решении задач профессиональной деятельности

##### **Материальное обеспечение:**

Раздаточный материал (карточки с заданиями).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

**Задание:**

1. Решить задачи с применением дифференциальных уравнений.

Найти уравнение движения тела.

36. Написать уравнение линии, проходящей через точку  $A (-1; 0)$  и всюду имеющей касательную с угловым коэффициентом, равным 2.
37. Найти уравнение кривой, проходящей через точку  $A (3; 1)$  и имеющей касательную, угловый коэффициент которой равен  $2x - 1$ .
38. Найти уравнение кривой, проходящей через точку  $A (4; 4)$  и имеющей касательную с угловым коэффициентом  $k =$  .
39. Написать уравнение кривой, проходящей через точку  $A (-1; 0)$  и имеющей касательную с угловым коэффициентом  $k=y$ .

Краткие теоретические сведения:

*Дифференциальным уравнением* называют уравнение, связывающее независимые переменные, их функцию и производные (или дифференциалы) этой функции. Если независимая переменная одна, то уравнение называют *обыкновенным*; если же независимых переменных две или больше, то уравнение называют *дифференциальным уравнением в частных производных*.

Наивысший порядок производной, входящей в уравнение, называют *порядком* дифференциального уравнения. Например:

- 1)  $x^2 y' - 5xy = y^2$  — обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка;
- 2)  $y'' = x^2$  — обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка;
- 3)  $y'^2 + y''y''' = x$  — обыкновенное дифференциальное уравнение третьего порядка;
- 4)  $F(x, y, y', y'') = 0$  — общий вид обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка;
- 5)  $x^2 \frac{dy}{dx} + y^2 = \frac{dy}{dx}$  — уравнение в частных производных первого порядка.

Будем рассматривать обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка, т.е. уравнения вида  $F(x, y, y') = 0$  или (в разрешенном относительно  $y'$  виде)  $y' = f(x, y)$ .

*Решением* дифференциального уравнения называют такую дифференцируемую функцию  $y = \varphi$ , которую при подстановке в уравнение вместо неизвестной функции обращает его в тождество. Процесс нахождения решения Дифференциального уравнения называют *интегрированием* дифференциального уравнения.

*Общим решением* дифференциального уравнения первого порядка  $y' = f(x, y)$  в области  $D$  называют функцию  $y = (x, C)$ , **обладающую** следующими свойствами: 1) она является решением данного уравнения при любых значениях произвольной постоянной  $C$ , принадлежащих некоторому множеству; 2) для любого начального условия  $y(x_0) = y_0$  такого, что  $(x_0; y_0) \in D$ , существует единственное значение  $C = C_0$ , при котором решение  $y = \varphi(x, C_0)$  удовлетворяет заданному начальному условию.

Всякое решение  $y = (x, C_0)$ , получающееся из общего решения  $y = (x, C)$  при конкретном значении  $C = C_0$ , называют *частным решением*.

Задача, в которой требуется найти частное решение уравнения  $y' = f(x, y)$ , удовлетворяющее начальному условию  $y(x_0) = y_0$ , называют *задачей Коши*.

Построенный на плоскости  $xOy$  график всякого решения  $y = (x)$  дифференциального уравнения называют *интегральной кривой* этого уравнения. Таким образом, общему решению  $y = (x, C)$  на плоскости  $xOy$  соответствует семейство интегральных кривых, зависящее от одного параметра — произвольной постоянной  $C$ , а частному решению, удовлетворяющему начальному условию  $y(x_0) = y_0$ , — кривая этого семейства, проходящая через заданную точку  $M_0(x_0; y_0)$ .

*Если функция  $f(x, y)$  непрерывна и имеет непрерывную частную производную в области  $D$  то решение дифференциального уравнения  $y' = f(x, y)$  при начальном условии  $y(x_0) = y_0$  существует и единственно, т.е. через точку  $(x_0; y_0)$  проходит единственная интегральная кривая данного уравнения (теорема Коши).*

*Особым решением* называют такое решение, во всех точках которого условие единственности не выполняется, т.е. в любой окрестности каждой точки  $(x; y)$  особого решения существуют по крайней мере две интегральные кривые, проходящие через эту точку.

Особые решения не получаются из общего решения дифференциального уравнения ни при каких значениях произвольной постоянной  $C$  (в том числе и при  $C = \pm$  ).

Особым решением является *огibaющая* семейства интегральных кривых (если она существует), т.е. линия, которая в каждой своей точке касается по меньшей мере одной интегральной кривой.

Например, общее решение уравнения  $y' = \pm\sqrt{1 - \sin(x)}$  записывается в виде  $y = \sin(x) + C$ . Это семейство интегральных кривых имеет две огibaющие:  $y = 1$  и  $y = -1$ , которые и являются особыми решениями.

Эта теория дифференциальных уравнений применяется для решения прикладных задач.

### Порядок выполнения работы:

- 1) Дифференциальные уравнения II порядка решаются двукратным интегрированием, путём введения новой переменной  $p = \frac{dy}{dx}$

Приводим к уравнению с разделяющимися переменными и решаем относительно  $p$ .

Подставляем  $p$  и решаем уравнение разделением переменных относительно  $y$ .

Если даны начальные условия, то подставляем в общее решение, составляем систему линейных уравнений и решаем относительно  $C_1$  и  $C_2$ .

Подставляя  $C_1$  и  $C_2$  в общее решение, находим частные решения.

- 2) Однородное дифференциальное уравнение II порядка.

Путем замены  $y = e^{kx}$

$$y' = ke^{kx}$$

$$y'' = k^2 e^{kx}$$

Составляем характеристическое уравнение  $k^2 + pk + q = 0$  из которого находим  $k_1$  и  $k_2$ .

Общее решение при  $D > 0$  будет:

$$y = c_1 e^{k_1 x} + c_2 e^{k_2 x}$$

При  $D = 0$  будет:  $y = e^{kx} (c_1 + c_2 x)$

При  $D < 0$  будет:  $y = e^{ax} (c_1 \cos bx + c_2 \sin bx)$

При заданных начальных условиях составляем систему линейных уравнений и решаем её относительно  $C_1$  и  $C_2$ .

### Ход работы:

- I. Решить дифференциальное уравнение порядка

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 1 - 2x$$



-Заменяем  $p = \frac{dy}{dx}$ , получим:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}; \frac{dp}{dx} = 1 - 2x$$

-Разделим переменные

$$dp = (1 - 2x) dx$$

-Проинтегрируем

$$\int dp = \int (1 - 2x) dx$$

$$p = x - x^2 + c_1$$

-Заменяем  $p$  на  $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = x - x^2 + c_1$$

-Разделим переменные

$$dy = (x - x^2 + c_1) dx$$

-Проинтегрируем и получим общее решение

$$\int dy = \int (x - x^2 + c_1) dx$$

$$y = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + c_1x + c_2$$

II. Решить однородное дифференциальное уравнение II порядка

a)  $y'' - 5y' + 6 = 0$

-Составим характеристическое уравнение

$$k^2 - 5k + 6 = 0, \text{ решаем квадратное уравнение, получим}$$

$$k_1 = 2, k_2 = 3$$

-Общее решение будет:

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$$

b)  $y'' + 4y' + 4y = 0$

-Составим характеристическое уравнение

$$k^2 + 4k + 4 = 0, (k + 2)^2 = 0 \quad k = -2$$

-Запишем общее решение для  $D=0$

$$y = e^{-2x} (c_1 + c_2 x)$$

c)  $y'' - 6y' + 13y = 0$

-Составим характеристическое уравнение

$$k^2 - 6k + 12 = 0; D = 36 - 4 \cdot 13 = -16 < 0$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{16i^2}}{2} = \frac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2ia = 3; b = 2$$

-Запишем общее решение

$$y = e^{3x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$$

**Форма представления результата:** выполненное задание.

### **Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

## **Тема 1.3 Дифференциальные уравнения**

### **Практическая работа №24**

#### **Решение дифференциальных уравнений второго порядка**

**Цель работы:** Научиться решать дифференциальные уравнения II порядка и линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка с постоянными коэффициентами.

#### **Выполнив работу, Вы будете:**

уметь:

- решать дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка;
- находить общее и частное решение простейших дифференциальных уравнений второго порядка;
- находить общее и частное решение линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

#### **Материальное обеспечение:**

Индивидуальные задания, таблицы, справочники, учебники, конспекты лекций.

#### **Задание:**

1. Решить дифференциальные уравнения II порядка:

a)  $\frac{d^2y}{dx^2} = 5$

b)  $y'' = x, A(1; 0); B(1; 1)$

2. Найти частное решение однородного дифференциального уравнения II порядка.

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = 0 \text{ при } x = 0; y = 0; \frac{dy}{dx} = 0$$

**Порядок выполнения работы:**

3) Дифференциальные уравнения II порядка решаются двукратным интегрированием, путём введения новой переменной  $p = \frac{dy}{dx}$

Приводим к уравнению с разделяющимися переменными и решаем относительно p.

Подставляем p и решаем уравнение разделением переменных относительно y.

Если даны начальные условия, то подставляем в общее решение, составляем систему линейных уравнений и решаем относительно  $C_1$  и  $C_2$ .

Подставляя  $C_1$  и  $C_2$  в общее решение, находим частные решения.

4) Однородное дифференциальное уравнение II порядка.

Путем замены  $y = e^{kx}$

$$y' = ke^{kx}$$

$$y'' = k^2 e^{kx}$$

Составляем характеристическое уравнение  $k^2 + pk + q = 0$  из которого находим  $k_1$  и  $k_2$ .

Общее решение при  $D > 0$  будет:

$$y = c_1 e^{k_1 x} + c_2 e^{k_2 x}$$

При  $D = 0$  будет:  $y = e^{kx}(c_1 + c_2 x)$

При  $D < 0$  будет:  $y = e^{ax}(c_1 \cos bx + c_2 \sin bx)$

При заданных начальных условиях составляем систему линейных уравнений и решаем её относительно  $C_1$  и  $C_2$ .

**Ход работы:**

III. Решить дифференциальное уравнение порядка

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 1 - 2x$$

-Заменим  $p = \frac{dy}{dx}$ , получим:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx}; \frac{dp}{dx} = 1 - 2x$$

-Разделим переменные

$$dp = (1 - 2x) dx$$

-Проинтегрируем

$$\int dp = \int (1 - 2x) dx$$

$$p = x - x^2 + c_1$$

-Заменяем  $p$  на  $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = x - x^2 + c_1$$

-Разделим переменные

$$dy = (x - x^2 + c_1) dx$$

-Проинтегрируем и получим общее решение

$$\int dy = \int (x - x^2 + c_1) dx$$

$$y = \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + c_1 x + c_2$$

IV. Решить однородное дифференциальное уравнение II порядка

d)  $y'' - 5y' + 6 = 0$

-Составим характеристическое уравнение

$$k^2 - 5k + 6 = 0, \text{ решаем квадратное уравнение, получим}$$

$$k_1 = 2, k_2 = 3$$

-Общее решение будет:

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$$

e)  $y'' + 4y' + 4y = 0$

-Составим характеристическое уравнение

$$k^2 + 4k + 4 = 0, (k + 2)^2 = 0 \quad k = -2$$

-Запишем общее решение для  $D=0$

$$y = e^{-2x} (c_1 + c_2 x)$$

f)  $y'' - 6y' + 13y = 0$

-Составим характеристическое уравнение

$$k^2 - 6k + 12 = 0; D = 36 - 4 \cdot 13 = -16 < 0$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{16i^2}}{2} = \frac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2ia = 3; b = 2$$

-Запишем общее решение

$$y = e^{3x} (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$$

**Форма представления результата:** выполненное задание.

**Критерии оценки:**

**Оценка "отлично"** ставится, если работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и аккуратно выполнены все записи и вычисления.

**Оценка "хорошо"** ставится, если выполнены требования к оценке "отлично", но допущены 2-3 недочета.

**Оценка "удовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

**Оценка "неудовлетворительно"** ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.