

Контрольная №4
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ И
ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
ФУНКЦИЙ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ
для заочников специальности 221000(ускор.)

Александр Л. Анисимов

18 января 2012 г.

Вариант 1

1. Найти экстремум функции.

$$z = 2x^2 + 2xy + 2y^2 - 20x - 22y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -x^3 - y^3 - 3z^3 + x^2y - 2x^2z + 2xy^2 - 6xz^2 - 5yz^2 - 2xyz,$$

$$A(3, 1, -4), B(2.96, 1.03, -3.97).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 144x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \sin \frac{xy}{4} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 32, 4y = x^2 (y \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (2x + 5y) dx dy dz; V : z = 10x^2 + 8y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \sin(3xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 3, y = 2x, z = 0, z = \pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6y, x^2 + y^2 = 10y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 2

1. Найти экстремум функции.

$$z = -2x^2 + 2xy - 4y^2 + 20x - 24y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -x^3 - 2z^3 - 5x^2y - 5x^2z + 4xy^2 - 2xz^2 - 4yz^2 - xyz,$$

$$A(6, 2, 2), B(6.04, 1.99, 2.05).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (27x^2y^2 + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y \cos \frac{xy}{4} dx dy; D : y = 2\pi, y = 4\pi, x = 2, x = 6.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{9 - y^2}, x = 3 - \sqrt{9 - y^2}, y = 0 (y \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (6x^2 + 6y^2) dx dy dz; V : z = 2x + y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \operatorname{sh}(2xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 2, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4x = 0, z = 8 - x^2, z = 0.$$

Вариант 3

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 - y^2 + 4x + 10y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3y^3 - 5z^3 + x^2y + 3x^2z - 2xy^2 - xz^2 + 4xyz,$$

$$A(4, 2, 0), B(4.04, 1.95, 0.05).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y \cos xy dx dy; D : y = \pi, y = 5\pi, x = 4, x = 8.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{2}, y = \frac{1}{2x}, x = 25.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (4 + 8z^3) dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \operatorname{sh}(xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 1, y = x, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2x, z = 8 - y^2, z = 0.$$

Вариант 4

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 + y^2 - 2x + 8y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 2x^3 - 4y^3 - 3z^3 - 3x^2y - 6x^2z - 2xz^2 - 5yz^2 - 6xyz,$$

$$A(-3, 4, 4), B(-3.06, 3.97, 3.94).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (18x^2y^2 + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12ye^{xy} dx dy; D : y = \ln 2, y = \ln 5, x = 1, x = 4.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 40 - x^2, y = -6x.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2})^5}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2z \cos(2xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 2, y = 0, y = 2, z = 0, z = \pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 2x = 0, z = \frac{9}{4} - x^2, z = 0.$$

Вариант 5

1. Найти экстремум функции.

$$z = -4x^2 - 2xy - 2y^2 + 16x + 4y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 - 4z^3 - 4x^2y + 4x^2z - xy^2 + 3xz^2 - 2yz^2 + xyz,$$

$$A(0, 3, 0), B(0.04, 3.01, -0.04).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (27x^2y^2 + 32x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y \sin \frac{xy}{6} dx dy; D : y = 3\pi, y = 5\pi, x = 1, x = 4.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = 45 - y^2, x = -4y.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3})^4}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \operatorname{sh}(3xy) dxdydz; V : x = 4, y = 0, y = x, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}y, z = x^2 + y^2 - 4, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 6

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 + 4xy - y^2 + 16x - 8y + 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 - 3y^3 - 4z^3 + x^2y + 2x^2z - xz^2 + 3yz^2 + 2xyz,$$

$$A(0, -3, 4), B(-0.04, -3.05, 3.99).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16xy + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y \cos \frac{xy}{4} dx dy; D : y = 2\pi, y = 6\pi, x = 3, x = 7.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{2}{x}, y = 3e^x, y = 2, y = 3.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{10} + \frac{y}{9} + \frac{z}{2})^5}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{10} + \frac{y}{9} + \frac{z}{2} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \sin(3xy) dxdydz; V : x = 0, y = 3, y = 4x, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 5y, x^2 + y^2 = 8y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 7

1. Найти экстремум функции.

$$z = -3x^2 + 4xy - 5y^2 - 6x - 18y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 2x^3 - 5y^3 - 6z^3 + 4x^2y + 4x^2z - 5xy^2 - xz^2 - 4yz^2 + xyz,$$

$$A(-1, -3, -1), B(-1.01, -2.95, -0.96).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 27x^2y^2) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 \cos \frac{xy}{6} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 7 - x^2, y = -6x.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{3} + \frac{y}{5} + \frac{z}{7})^6}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{3} + \frac{y}{5} + \frac{z}{7} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z \sin(5xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 4, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4x = 0, z = \frac{5}{4} - x^2, z = 0.$$

Вариант 8

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 + y^2 + 2x - 2y - 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -3x^3y^3z^3 - 4x^2y + 2x^2z - 3xy^2 - 6yz^2 - 6xyz,$$

$$A(-4, -2, 2), B(-3.98, -2.04, 1.99).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (48x^3y^3 + 36x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 \sin 4xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{2}{x}, y = 3e^x, y = 2, y = 3.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (4x + 2y) dx dy dz; V : z = 4x^2 + 3y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 \cos(4xy) dx dy dz; V : x = 1, y = 0, y = 4x, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, z = 2 - x^2, z = 0.$$

Вариант 9

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 - y^2 - 10x - 6y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -2y^3 - 6z^3 + 3x^2y - 3x^2z - xy^2 + 4yz^2 - 6xyz,$$

$$A(1, -4, 0), B(1.06, -3.98, -0.06).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (27x^2y^2 + 16x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8ye^{xy} dx dy; D : y = \ln 2, y = \ln 5, x = 1, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{2}{x}, y = 5e^x, y = 2, y = 5.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (36 + 72\sqrt{y}) dx dy dz; V : y = 9x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 \cos(5xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 3, y = 4x, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4x, x^2 + y^2 = 7x, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, y = 0 (y \geq 0).$$

Вариант 10

1. Найти экстремум функции.

$$z = -2x^2 - 4xy - 3y^2 - 4x - 2y + 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -5x^3z^3 + 4x^2y - 5x^2z - 2xy^2 + 3xz^2 + 2yz^2 - 4xyz,$$

$$A(6, 1, 0), B(6.05, 0.96, 0.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (27x^2y^2 + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 \cos \frac{xy}{6} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = 24 - y^2, x = -10y.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (5x + 7y) dx dy dz; V : z = 7x^2 + 8y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 \operatorname{ch}(5xy) dx dy dz; V : x = 4, y = 0, y = x, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}x = 0, z = x^2 + y^2 - 4, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 11

1. Найти экстремум функции.

$$z = 2x^2 + 2xy + 2y^2 + 4x + 14y - 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^3 - 5y^3 - 5z^3 - 6x^2y - 6x^2z + 3xy^2 - xz^2 - 6yz^2 + 2xyz,$$

$$A(4, 4, 6), B(4.02, 3.99, 6.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (36x^2y^2 + 50x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \cos \frac{xy}{6} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 11 - x^2, y = -10x.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (16 + 32y^3) dx dy dz; V : y = 9x, y = 0, x = 2, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z \operatorname{ch}(3xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 4, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, z = \frac{21}{4} - x^2, z = 0.$$

Вариант 12

1. Найти экстремум функции.

$$z = 5x^2 + 4xy + 3y^2 + 2x + 14y - 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 4x^3y^3 - 5z^3 - 2x^2z + xy^2 - 4yz^2 - 5xyz,$$

$$A(-3, -5, 0), B(-3.01, -4.99, 0.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (36x^2y^2 + 48x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y \cos \frac{xy}{4} dx dy; D : y = 3\pi, y = 6\pi, x = 1, x = 4.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{25 - y^2}, x = 5 - \sqrt{25 - y^2}, y = 0 (y \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (7x^2 + 5y^2) dx dy dz; V : z = 3x, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \sin(3xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 4, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4x = 0, z = \frac{21}{4} - x^2, z = 0.$$

Вариант 13

1. Найти экстремум функции.

$$z = 4x^2 - 4xy + 2y^2 + 48x - 32y - 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -2x^3 - y^3 - 3z^3 - 5x^2y - 2x^2z - 2xy^2 - 5xz^2 - 2yz^2 - 5xyz,$$

$$A(-4, 3, 4), B(-4.06, 3.01, 3.97).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16xy + 32x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 e^{\frac{xy}{4}} dx dy; D : x = 0, y = 4, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 2\sqrt{x}, y = \frac{2}{x}, x = 25.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{8} + \frac{y}{9} + \frac{z}{6})^5}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{8} + \frac{y}{9} + \frac{z}{6} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2z \sin(xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 2, y = 0, y = 3, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, z = \frac{29}{4} - x^2, z = 0.$$

Вариант 14

1. Найти экстремум функции.

$$z = 5x^2 - 4xy + 2y^2 + 16x - 16y - 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 4x^3y^3z^3 + 4x^2y + 4x^2z - 3xy^2 + 3xz^2 - yz^2 - 2xyz,$$

$$A(-4, -3, 2), B(-3.99, -3.05, 2.01).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (48x^3y^3 + 36x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \cos xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{3}{x}, y = 6e^x, y = 3, y = 6.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{9} + \frac{y}{8} + \frac{z}{6})^3}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{9} + \frac{y}{8} + \frac{z}{6} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 \operatorname{ch}(3xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 4, y = 4x, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, z = \frac{9}{4} - x^2, z = 0.$$

Вариант 15

1. Найти экстремум функции.

$$z = 4x^2 + 2xy + y^2 + 22x + 4y - 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -3x^3y^3 - 6z^3 - x^2y - 6x^2z - 4xy^2 - 2xz^2 + 3yz^2 - 3xyz,$$

$$A(-2, 2, -4), B(-1.95, 2.06, -3.96).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (4xy + 25x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 \cos \frac{xy}{6} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{3\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{1}, y = \frac{1}{1x}, x = 16.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 3xyz dx dy dz; V : y = 6x, y = 0, x = 3, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 e^{4xy} dx dy dz; V : x = 3, y = 0, y = x, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, x^2 + y^2 = 10x, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, y = 0 (y \leq 0).$$

Вариант 16

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 + y^2 + 4x + 8y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 4x^3 - 2y^3 - 5z^3 - 5xy^2 - 3xz^2 + 3yz^2 - 3xyz,$$

$$A(1, 5, -2), B(1.03, 5.05, -2.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (36x^2y^2 + 100x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{4xy} dx dy; D : x = 0, y = 3, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{3}{x}, y = 6e^x, y = 3, y = 6.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (7y^2 + 6z^2) dx dy dz; V : z = 6y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 \sin(xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 1, y = x, z = 0, z = \pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4\sqrt{2}y, z = x^2 + y^2 - 16, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 17

1. Найти экстремум функции.

$$z = 4x^2 + 2xy + y^2 - 34x - 16y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -5x^3 - 2y^3 - 3z^3 - 4x^2y - 5x^2z + 3xy^2 - 2xz^2 + xyz,$$

$$A(0, -2, 2), B(0.01, -2.03, 1.96).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 36x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{\frac{xy}{6}} dx dy; D : x = 0, y = 3, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{3}{x}, y = 6e^x, y = 3, y = 6.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (8y^2 + 4z^2) dx dy dz; V : z = 10x + 6y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \cos(6xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 1, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4x = 0, z = 4 - x^2, z = 0.$$

Вариант 18

1. Найти экстремум функции.

$$z = 2x^2 - 2xy + 2y^2 + 22x - 20y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 4x^3 - 3x^2y + 2xy^2 + yz^2 + xyz,$$

$$A(-2, -3, -2), B(-2.02, -3.03, -1.94).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (18x^2y^2 + 144x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 \cos 6xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 72, 6y = -x^2 (y \leq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{3} + \frac{y}{8} + \frac{z}{7})^3}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{3} + \frac{y}{8} + \frac{z}{7} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \operatorname{sh}(4xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 2, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 6x = 0, z = \frac{9}{4} - y^2, z = 0.$$

Вариант 19

1. Найти экстремум функции.

$$z = 4x^2 - 4xy + 5y^2 + 4x + 22y - 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^3 - 6y^3 - 6x^2y + xy^2 - 2xz^2 + 2yz^2 + xyz,$$

$$A(-1, 4, 2), B(-1.02, 4.05, 2.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (9x^2y^2 + 64x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \cos xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{1}{x}, y = 2e^x, y = 1, y = 2.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (8y^2 + 4z^2) dx dy dz; V : z = 10x + 3y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \sin(xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 2, y = x, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6y, x^2 + y^2 = 11y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 20

1. Найти экстремум функции.

$$z = -4x^2 - 8xy - 5y^2 + 8x + 4y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^3 - 3y^3z^3 - x^2y + 3x^2z - xy^2 - 3xz^2 - 4yz^2 - 2xyz,$$

$$A(-2, 3, 0), B(-1.94, 2.96, -0.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (18x^2y^2 + 144x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \cos \frac{xy}{4} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 3 - x^2, y = -2x.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (6x^2 + 4y^2) dx dy dz; V : z = 6y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 z e^{5xyz} dx dy dz; V : x = 0, x = 2, y = 0, y = 3, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, x^2 + y^2 = 8x, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, y = 0 (y \geq 0).$$

Вариант 21

1. Найти экстремум функции.

$$z = 3x^2 + 4xy + 2y^2 - 34x - 24y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -6x^3y^3 - 4z^3 - 4x^2y - 4x^2z - 3xy^2 + 2xz^2 + 2xyz,$$

$$A(-5, 2, 1), B(-5.04, 1.97, 0.97).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16xy + 50x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 \cos \frac{xy}{4} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{3\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{4}, y = \frac{1}{4x}, x = 16.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2xyz dx dy dz; V : y = 14x, y = 0, x = 3, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z \cos(4xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 3, y = 0, y = 4, z = 0, z = \pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4y, x^2 + y^2 = 9y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 22

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 - y^2 - 8x + 6y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -3x^3 - 2y^3z^3 - 5x^2y - 5x^2z - 6xy^2 + xz^2 - 6yz^2 + 3xyz,$$

$$A(-2, 4, -3), B(-2.02, 3.94, -3.04).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \sin 4xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{3}{x}, y = 5e^x, y = 3, y = 5.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (16 + 32y^3) dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \sin(5xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 2x = 0, z = \frac{25}{4} - x^2, z = 0.$$

Вариант 23

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 + y^2 - 8x + 4y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -3x^3 - 3y^3 - 5z^3 - 3x^2y + 4xy^2 + 3xz^2 - 4yz^2 - 2xyz,$$

$$A(-2, -2, -1), B(-2.01, -2.03, -0.98).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 64x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{4xy} dx dy; D : x = 0, y = 2, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{1}{x}, y = 3e^x, y = 1, y = 3.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (5x + 5y) dx dy dz; V : z = x^2 + 5y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \cos(xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 2, y = 0, y = 3, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, z = \frac{9}{4} - y^2, z = 0.$$

Вариант 24

1. Найти экстремум функции.

$$z = 3x^2 + 2xy + 4y^2 - 2x + 36y + 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -3x^3y^3z^3 - 2x^2z - xy^2 - 6xz^2 + yz^2 - 4xyz,$$

$$A(-5, -2, -4), B(-4.97, -2.01, -3.98).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 16x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{\frac{xy}{6}} dx dy; D : x = 0, y = 4, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{4}, y = \frac{1}{4x}, x = 9.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{10})^4}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{10} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \cos(3xy) dx dy dz; V : x = 4, y = 0, y = x, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}x = 0, z = x^2 + y^2 - 4, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 25

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 - y^2 - 8x + 10y - 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^3y^3 + 4x^2y - 6x^2z - 6xy^2 - 4xz^2 - 2yz^2 + 4xyz,$$

$$A(3, 3, -2), B(2.94, 3.06, -1.94).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16x^3y^3 + 108x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \sin \frac{xy}{4} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{16 - y^2}, x = 4 - \sqrt{16 - y^2}.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{7} + \frac{y}{3} + \frac{z}{10})^6}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{7} + \frac{y}{3} + \frac{z}{10} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z \cos(2xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 3, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 5y, x^2 + y^2 = 8y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 26

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 + 4xy - 3y^2 + 18x + 6y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 2x^3 - 4y^3 - 4z^3 - x^2y - x^2z - 4xy^2 - xz^2 - 4yz^2 - 3xyz,$$

$$A(-4, 1, -1), B(-4.04, 1.02, -0.99).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (4xy + 9x^2y^2) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 e^{xy} dx dy; D : x = 0, y = 4, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{3}{x}, y = 5e^x, y = 3, y = 5.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (8x + 5y) dx dy dz; V : z = 3x^2 + 6y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \cos(4xy) dx dy dz; V : x = 1, y = 0, y = 3x, z = 0, z = \pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2x, x^2 + y^2 = 7x, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, y = 0 (y \leq 0).$$

Вариант 27

1. Найти экстремум функции.

$$z = 2x^2 - 2xy + 4y^2 - 28x + 42y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -5x^3 - 3y^3 + 4x^2y - 5x^2z - 2xy^2 - 2xz^2 - 3yz^2 + 4xyz,$$

$$A(-1, 2, -3), B(-0.95, 1.97, -2.99).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (36x^2y^2 + 72x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 e^{\frac{xy}{6}} dx dy; D : x = 0, y = 4, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{2}, y = \frac{1}{2x}, x = 25.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2xyz dx dy dz; V : y = 26x, y = 0, x = 1, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \operatorname{ch}(3xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 3, y = 0, y = 3, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}x = 0, z = x^2 + y^2 - 4, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 28

1. Найти экстремум функции.

$$z = -2x^2 + 2xy - 2y^2 + 24x - 24y - 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -6x^3y^3 - 3z^3 - x^2y + 3x^2z - xy^2 + xz^2 - 3yz^2,$$

$$A(-1, 4, 6), B(-0.97, 3.98, 5.94).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16xy + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 e^{xy} dx dy; D : x = 0, y = 2, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = 12 - y^2, x = -4y.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (7y^2 + z^2) dx dy dz; V : z = y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z \operatorname{sh}(5xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 3, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6y, x^2 + y^2 = 11y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 29

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 + 2xy - 4y^2 + 12y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -2y^3 - 3z^3 + 3x^2y + 4x^2z + xy^2 + 2xz^2 - 6yz^2 + 3xyz,$$

$$A(4, -1, 4), B(4.02, -0.97, 4.02).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8ye^{\frac{xy}{6}} dx dy; D : y = \ln 4, y = \ln 6, x = 3, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 50, 5y = x^2 (y \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (x + 8y) dx dy dz; V : z = 10x^2 + 2y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \operatorname{sh}(xy) dx dy dz; V : x = 2, y = 0, y = 4x, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}x = 0, z = x^2 + y^2 - 4, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 30

1. Найти экстремум функции.

$$z = 5x^2 - 4xy + y^2 - 26x + 12y - 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 4x^3 - 3y^3 - 3z^3 + 2x^2y + x^2z + 2yz^2 - 5xyz,$$

$$A(-2, -3, 3), B(-2.06, -2.95, 3.04).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y \cos 4xy dx dy; D : y = 2\pi, y = 5\pi, x = 1, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 65 - x^2, y = -8x.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{2} + \frac{y}{7} + \frac{z}{5})^4}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{2} + \frac{y}{7} + \frac{z}{5} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \operatorname{ch}(5xyz) dxdydz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 2, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 2x = 0, z = \frac{5}{4} - x^2, z = 0.$$

Вариант 31

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 - 2xy + 2y^2 + 18x - 26y - 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -3x^3 - 3y^3 - 4z^3 - x^2y - 4x^2z - xy^2 - 6xz^2 - 3yz^2 + 2xyz,$$

$$A(2, 3, 2), B(1.98, 2.96, 1.96).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 100x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 e^{\frac{xy}{4}} dx dy; D : x = 0, y = 3, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{3}{x}, y = 5e^x, y = 3, y = 5.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{9} + \frac{y}{8} + \frac{z}{4})^3}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{9} + \frac{y}{8} + \frac{z}{4} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2z \operatorname{sh}(xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 2, y = 0, y = 3, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4x = 0, z = \frac{5}{4} - y^2, z = 0.$$

Вариант 32

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 + y^2 + 10x - 8y - 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -5x^3 - z^3 + 3x^2y + 3x^2z + 2xy^2 + 2xz^2 - 5yz^2 + 2xyz,$$

$$A(-4, 6, -3), B(-3.95, 5.94, -3.02).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (27x^2y^2 + 48x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y \sin \frac{xy}{4} dx dy; D : y = 2\pi, y = 3\pi, x = 1, x = 3.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{1}{x}, y = 4e^x, y = 1, y = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (5x + 4y) dx dy dz; V : z = 7x^2 + 2y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \cos(5xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 3, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 8\sqrt{2}y = 0, z = x^2 + y^2 - 64, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 33

1. Найти экстремум функции.

$$z = 4x^2 - 4xy + 3y^2 + 4x - 6y - 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -6x^3 - y^3 - 2x^2y - 4x^2z - 3xy^2 - xz^2 + 4yz^2,$$

$$A(-3, 0, 0), B(-2.94, 0.01, 0.02).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (27x^2y^2 + 108x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y \cos 6xy dx dy; D : y = 2\pi, y = 4\pi, x = 4, x = 7.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 11 - x^2, y = -10x.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{4} + \frac{y}{7} + \frac{z}{2})^5}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{4} + \frac{y}{7} + \frac{z}{2} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \cos(6xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 3, y = 2x, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, x^2 + y^2 = 8x, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, y = 0 (y \leq 0).$$

Вариант 34

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 + 6xy - 2y^2 + 46x - 28y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -5x^3 - 4y^3 - z^3 + x^2y - x^2z + xy^2 + xz^2 - yz^2,$$

$$A(-6, 0, 3), B(-5.95, 0.06, 3.01).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 64x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y \cos xy dx dy; D : y = 2\pi, y = 4\pi, x = 3, x = 6.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \sqrt{144 - x^2}, y = 12 - \sqrt{144 - x^2}, x = 0 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y dx dy dz; V : y = 14x, y = 0, x = 1, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \operatorname{sh}(3xy) dx dy dz; V : x = 1, y = 0, y = x, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 6x = 0, z = 8 - y^2, z = 0.$$

Вариант 35

1. Найти экстремум функции.

$$z = -4x^2 + 4xy - 5y^2 - 52x + 66y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -6x^3 - 6y^3 - 2z^3 + 3x^2y - 2x^2z - xy^2 - 6xz^2 + 2yz^2 - 5xyz,$$

$$A(-5, 3, 3), B(-5.06, 3.06, 3.02).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (18x^2y^2 + 144x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y \cos xy dx dy; D : y = 3\pi, y = 4\pi, x = 3, x = 7.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{3}{x}, y = 6e^x, y = 3, y = 6.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (2x + 5y) dx dy dz; V : z = x^2 + 2y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \sin(2xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 2, y = 0, y = 4, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4y, x^2 + y^2 = 7y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 36

1. Найти экстремум функции.

$$z = 5x^2 - 2xy + 2y^2 + 48x - 24y - 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 2x^3 - 4y^3 - z^3 - 5x^2z - 6xy^2 + 3xz^2 - 5yz^2 + 3xyz,$$

$$A(-4, 1, 0), B(-4.03, 1.06, -0.01).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (36x^2y^2 + 36x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 e^{6xy} dx dy; D : x = 0, y = 3, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 2, 1y = x^2 (y \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (3x + y) dx dy dz; V : z = 6x^2 + 2y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 e^{4xy} dx dy dz; V : x = 0, y = 2, y = 3x, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6\sqrt{2}x, z = x^2 + y^2 - 36, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 37

1. Найти экстремум функции.

$$z = -3x^2 - 6xy - 5y^2 + 6x + 6y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 4x^3 3y^3 4z^3 + 4x^2 y + 4x^2 z - 3xy^2 - 3xz^2 - 4yz^2 + 3xyz,$$

$$A(4, 2, -1), B(3.94, 2.05, -0.98).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 64x^3 y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{4xy} dx dy; D : x = 0, y = 4, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 50, 5x = y^2 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (2x + 5y) dx dy dz; V : z = 2x^2 + 4y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 e^{6xy} dx dy dz; V : x = 0, y = 4, y = 4x, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4x = 0, z = 8 - y^2, z = 0.$$

Вариант 38

1. Найти экстремум функции.

$$z = -4x^2 - 2xy - y^2 + 14x + 8y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^3 - 6y^3 - 3x^2y + x^2z - 3xy^2 - 6xz^2 - 5yz^2 - 6xyz,$$

$$A(3, 1, -4), B(3.02, 1.02, -4.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 100x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y \sin \frac{xy}{4} dx dy; D : y = \pi, y = 3\pi, x = 1, x = 3.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{1}, y = \frac{1}{1x}, x = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{9} + \frac{y}{8} + \frac{z}{5})^6}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{9} + \frac{y}{8} + \frac{z}{5} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 \sin(4xy) dx dy dz; V : x = 2, y = 0, y = x, z = 0, z = \pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, z = \frac{13}{4} - y^2, z = 0.$$

Вариант 39

1. Найти экстремум функции.

$$z = 5x^2 - 2xy + 3y^2 + 36x + 4y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 2x^3y^3 - 3z^3 - 3x^2y - 4x^2z - 3xy^2 + 2xz^2 - 3yz^2 + xyz,$$

$$A(1, 1, -1), B(0.98, 1.05, -0.97).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (36x^2y^2 + 16x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D ye^{\frac{xy}{4}} dx dy; D : y = \ln 2, y = \ln 5, x = 2, x = 6.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \sqrt{100 - x^2}, y = 10 - \sqrt{100 - x^2}, x = 0 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (8x + 3y) dx dy dz; V : z = 7x^2 + 4y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \operatorname{sh}(6xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 3, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}x, z = x^2 + y^2 - 4, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 40

1. Найти экстремум функции.

$$z = -3x^2 - 2xy - 5y^2 + 22x + 26y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3y^3 - 2z^3 - 2x^2y + x^2z - 3xy^2 - xz^2 - 6yz^2 - 5xyz,$$

$$A(0, -1, -4), B(0.02, -0.98, -4.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16xy + 36x^2y^2) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{xy} dx dy; D : x = 0, y = 3, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{100 - y^2}, x = 10 - \sqrt{100 - y^2}.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (4x^2 + y^2) dx dy dz; V : z = 6x + 2y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \sin(4xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 2, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 6x = 0, z = \frac{21}{4} - y^2, z = 0.$$

Вариант 41

1. Найти экстремум функции.

$$z = -4x^2 - 2xy - 3y^2 + 20x - 6y - 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -6x^3 - 3y^3 - 5z^3 + x^2y - x^2z + 4xy^2 - 6xz^2 - 4yz^2 + xyz,$$

$$A(5, -1, -4), B(5.03, -1.05, -4.06).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16x^3y^3 + 144x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \sin xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \sqrt{16 - x^2}, y = 4 - \sqrt{16 - x^2}, x = 0 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{5} + \frac{y}{5} + \frac{z}{10})^5}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{5} + \frac{y}{5} + \frac{z}{10} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 \operatorname{ch}(xy) dx dy dz; V : x = 1, y = 0, y = x, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4\sqrt{2}y = 0, z = x^2 + y^2 - 16, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 42

1. Найти экстремум функции.

$$z = -4x^2 + 4xy - 5y^2 + 16x - 24y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -5x^3y^3 - 4z^3 + 4x^2y - 5x^2z + 4xy^2 + 3yz^2 + xyz,$$

$$A(1, -1, 3), B(0.98, -0.98, 3.02).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 25x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12ye^{\frac{xy}{6}} dx dy; D : y = \ln 4, y = \ln 6, x = 2, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \sqrt{81 - x^2}, y = 9 - \sqrt{81 - x^2}, x = 0 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{6} + \frac{y}{10} + \frac{z}{2})^3}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{6} + \frac{y}{10} + \frac{z}{2} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \cos(4xy) dxdydz; V : x = 1, y = 0, y = 4x, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 6\sqrt{2}y = 0, z = x^2 + y^2 - 36, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 43

1. Найти экстремум функции.

$$z = -2x^2 + 2xy - 3y^2 - 2x - 24y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -5x^3 - 2y^3 + 4z^3 - 3x^2y - 6x^2z - xy^2 + 3xz^2 - 6yz^2 + xyz,$$

$$A(2, 1, 2), B(1.98, 0.94, 2.05).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 64x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D ye^{4xy} dx dy; D : y = \ln 2, y = \ln 5, x = 3, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{64 - y^2}, x = 8 - \sqrt{64 - y^2}, y = 0 (y \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (49 + 98\sqrt{y}) dx dy dz; V : y = 9x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \operatorname{sh}(3xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 2, y = 0, y = 4, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2y, x^2 + y^2 = 7y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 44

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 + y^2 + 4x + 2y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 - 2y^3 - 4z^3 - 4x^2y - 5x^2z + 2xy^2 - 3xz^2 - yz^2 + 4xyz,$$

$$A(-1, -1, -5), B(-0.95, -1.05, -4.97).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16xy + 50x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y \cos \frac{xy}{4} dx dy; D : y = 3\pi, y = 4\pi, x = 4, x = 6.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 27 - x^2, y = -6x.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{7} + \frac{y}{5} + \frac{z}{7})^3}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{7} + \frac{y}{5} + \frac{z}{7} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \cos(5xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 2, z = 0, z = \pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2x, z = \frac{5}{4} - x^2, z = 0.$$

Вариант 45

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 - 6xy - 3y^2 - 28x - 12y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 - y^3 - 2z^3 + 3x^2y + 2x^2z - 2xy^2 + 3yz^2 - 5xyz,$$

$$A(-3, 1, 0), B(-2.96, 0.98, -0.01).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (18x^2y^2 + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y \sin xy dx dy; D : y = 2\pi, y = 3\pi, x = 3, x = 7.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 50, 5x = -y^2 (x \leq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (5y^2 + z^2) dx dy dz; V : z = 6x + 3y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \cos(5xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 1, y = x, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 8\sqrt{2}y = 0, z = x^2 + y^2 - 64, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 46

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 + 2xy - y^2 + 10x - 2y - 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -4x^3y^3z^3 + 2x^2z - 6xz^2 + 4xyz,$$

$$A(-4, -1, -1), B(-4.01, -0.99, -0.94).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 27x^2y^2) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \sin xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 128, 8x = y^2 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (25 + 50\sqrt{y}) dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 2, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z e^{6xyz} dx dy dz; V : x = 0, x = 2, y = 0, y = 2, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2x, z = \frac{21}{4} - y^2, z = 0.$$

Вариант 47

1. Найти экстремум функции.

$$z = -3x^2 + 4xy - 2y^2 - 20x + 16y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 4x^3y^3 - 2z^3 - 5x^2y + 4x^2z - 2xy^2 - yz^2 + 4xyz,$$

$$A(-4, 3, 3), B(-4.04, 2.95, 2.94).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (27x^2y^2 + 64x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \sin 6xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{3\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{3}, y = \frac{1}{3x}, x = 25.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (x^2 + 6y^2) dx dy dz; V : z = 6x + 2y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z \cos(3xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 4, z = 0, z = \pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 5y, x^2 + y^2 = 7y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 48

1. Найти экстремум функции.

$$z = 5x^2 - 4xy + 3y^2 + 30x + 10y - 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -2x^3 2y^3 - 6z^3 - 4x^2 y - x^2 z - 6xy^2 - 3yz^2 + 3xyz,$$

$$A(-6, 4, -4), B(-5.98, 4.06, -3.99).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 50x^4 y^4) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y \sin xy dx dy; D : y = \pi, y = 3\pi, x = 1, x = 4.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 2\sqrt{x}, y = \frac{2}{x}, x = 16.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (3x + y) dx dy dz; V : z = 2x^2 + 3y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \operatorname{ch}(4xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 4, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 2x = 0, z = \frac{17}{4} - y^2, z = 0.$$

Вариант 49

1. Найти экстремум функции.

$$z = -4x^2 - 2xy - y^2 - 22x - 10y + 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 2y^3 - 5z^3 - 3x^2y + x^2z + 2xy^2 - xz^2 - 5yz^2 - 6xyz,$$

$$A(3, 6, -2), B(3.06, 5.96, -2.05).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 25x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D ye^{4xy} dx dy; D : y = \ln 2, y = \ln 3, x = 1, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{5}, y = \frac{1}{5x}, x = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{6} + \frac{y}{6} + \frac{z}{4})^4}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{6} + \frac{y}{6} + \frac{z}{4} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \sin(3xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 2, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 6\sqrt{2}y = 0, z = x^2 + y^2 - 36, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 50

1. Найти экстремум функции.

$$z = 2x^2 + 6xy + 5y^2 + 30x + 48y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -6x^3y^3 - 4z^3 + x^2y + xy^2 - 6xz^2 - 3yz^2 - 2xyz,$$

$$A(-3, 3, -4), B(-3.02, 3.04, -4.01).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (9x^2y^2 + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12ye^{6xy} dx dy; D : y = \ln 2, y = \ln 3, x = 3, x = 7.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 18, 3x = y^2 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (2y^2 + 8z^2) dx dy dz; V : z = 4x + y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2z \sin(xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 2, y = 0, y = 1, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}y, z = x^2 + y^2 - 4, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 51

1. Найти экстремум функции.

$$z = -4x^2 - 2xy - y^2 - 22x + 2y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3y^3 - 6z^3 - 4x^2z + xy^2 + 3xz^2 - 2yz^2 - 4xyz,$$

$$A(-1, 2, 4), B(-0.95, 1.94, 3.96).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 9x^2y^2) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y \cos 4xy dx dy; D : y = \pi, y = 3\pi, x = 4, x = 6.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{2}{x}, y = 4e^x, y = 2, y = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{10})^4}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{10} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 e^{5xy} dx dy dz; V : x = 0, y = 2, y = x, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 8\sqrt{2}y = 0, z = x^2 + y^2 - 64, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 52

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 - 2xy - 2y^2 - 2x - 12y - 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -x^3 - 6y^3 - z^3 - 4x^2y + 2xz^2 - 2yz^2,$$

$$A(6, -5, 0), B(5.97, -4.96, 0.06).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (48x^3y^3 + 36x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y \cos 6xy dx dy; D : y = 3\pi, y = 7\pi, x = 4, x = 6.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \sqrt{4 - x^2}, y = 2 - \sqrt{4 - x^2}, x = 0 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (8y^2 + z^2) dx dy dz; V : z = 3x, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 \sin(6xy) dx dy dz; V : x = 4, y = 0, y = 2x, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4\sqrt{2}x, z = x^2 + y^2 - 16, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 53

1. Найти экстремум функции.

$$z = -4x^2 - 6xy - 4y^2 - 6x - 8y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -3x^3y^3z^3 + 2x^2y - 2x^2z - 2xy^2 - 2xz^2 - 4yz^2 - 4xyz,$$

$$A(0, -3, -4), B(0.02, -2.95, -3.98).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 64x^3y^3) dxdy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y \sin xy dxdy; D : y = \pi, y = 5\pi, x = 3, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \sqrt{144 - x^2}, y = 12 - \sqrt{144 - x^2}.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{5} + \frac{y}{7} + \frac{z}{3})^6}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{5} + \frac{y}{7} + \frac{z}{3} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2z \operatorname{sh}(xyz) dxdydz; V : x = 0, x = 3, y = 0, y = 2, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4y, x^2 + y^2 = 6y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 54

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 + 2xy - 2y^2 + 22x - 8y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -6x^34z^3 - 3x^2y + 3xy^2 - 5xz^2 - 6yz^2 - 6xyz,$$

$$A(-4, 4, 0), B(-4.05, 3.97, 0.02).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16xy + 27x^2y^2) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D ye^{6xy} dx dy; D : y = \ln 3, y = \ln 6, x = 4, x = 8.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{1}{x}, y = 2e^x, y = 1, y = 2.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z dx dy dz; V : y = 14x, y = 0, x = 3, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \cos(5xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 1, y = 4x, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 8\sqrt{2}x = 0, z = x^2 + y^2 - 64, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 55

1. Найти экстремум функции.

$$z = 3x^2 + 2xy + y^2 + 18x + 6y - 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 4y^3 3z^3 + 2x^2 y - 6x^2 z - 3xy^2 + 2xz^2 - 6yz^2,$$

$$A(4, -3, -5), B(4.05, -2.94, -4.95).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (4xy + 16x^3 y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \cos \frac{xy}{6} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{2}{x}, y = 5e^x, y = 2, y = 5.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (1 + 2\sqrt{z}) dx dy dz; V : y = 4x, y = 0, x = 2, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \sin(6xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 2, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4x, z = \frac{5}{4} - y^2, z = 0.$$

Вариант 56

1. Найти экстремум функции.

$$z = 2x^2 + 2xy + 3y^2 - 20x - 30y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -4x^3y^3 - 3z^3 + 4x^2y + 4x^2z + xz^2 - 3yz^2 - 2xyz,$$

$$A(-4, -2, 1), B(-4.05, -2.02, 1.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (9x^2y^2 + 72x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{4xy} dx dy; D : x = 0, y = 3, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{121 - y^2}, x = 11 - \sqrt{121 - y^2}.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{9} + \frac{y}{10} + \frac{z}{7})^4}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{9} + \frac{y}{10} + \frac{z}{7} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z \cos(xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 2, z = 0, z = \pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2x, z = \frac{17}{4} - y^2, z = 0.$$

Вариант 57

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 - 2xy + 4y^2 + 2x + 16y + 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -2y^3z^3 + 2x^2y - 3x^2z - 3xy^2 + 4xz^2 + 3xyz,$$

$$A(3, 3, -2), B(2.99, 3.02, -2.06).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (18x^2y^2 + 108x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \cos 6xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{3\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{1}{x}, y = 4e^x, y = 1, y = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V z^2 dx dy dz; V : y = 24x, y = 0, x = 2, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \operatorname{sh}(xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 2, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2x, x^2 + y^2 = 6x, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, y = 0 (y \geq 0).$$

Вариант 58

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 + y^2 + 2x + 10y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -5x^3 - 4y^3 + x^2y - 6x^2z + 2xy^2 - 5xz^2 - 4yz^2 - 3xyz,$$

$$A(1, -6, 5), B(0.96, -5.95, 5.05).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (18x^2y^2 + 25x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{4xy} dx dy; D : x = 0, y = 4, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{3}, y = \frac{1}{3x}, x = 16.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{3} + \frac{y}{9} + \frac{z}{3})^3}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{3} + \frac{y}{9} + \frac{z}{3} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z \cos(4xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 4, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 6\sqrt{2}x = 0, z = x^2 + y^2 - 36, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 59

1. Найти экстремум функции.

$$z = -3x^2 - 4xy - 4y^2 - 2x + 4y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 4x^3 - 3y^3 - 5z^3 + x^2y - 2x^2z - 4xy^2 - 6xz^2 - 4yz^2 + xyz,$$

$$A(3, 3, -6), B(3.05, 2.94, -6.06).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (4xy + 100x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12ye^{\frac{xy}{6}} dx dy; D : y = \ln 2, y = \ln 3, x = 4, x = 8.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 8 - x^2, y = -2x.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (4x^2 + 3y^2) dx dy dz; V : z = 10y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 \sin(4xy) dx dy dz; V : x = 2, y = 0, y = x, z = 0, z = \pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4\sqrt{2}x = 0, z = x^2 + y^2 - 16, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 60

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 + 6xy - 3y^2 - 12x + 12y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 4x^3 - 3y^3 - 5z^3 + x^2y - 4x^2z + xy^2 - 6xz^2 + yz^2 - 3xyz,$$

$$A(-2, 0, 4), B(-2.05, -0.01, 3.96).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 36x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \sin xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{2}, y = \frac{1}{2x}, x = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V yz^2 dx dy dz; V : y = 3x, y = 0, x = 1, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \operatorname{ch}(4xy) dx dy dz; V : x = 2, y = 0, y = 4x, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4y, x^2 + y^2 = 6y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 61

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 + y^2 + 4x - 6y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -2x^3 - 6x^2y - xy^2 - 5xz^2 - 2yz^2 - 2xyz,$$

$$A(5, 6, 3), B(5.05, 5.94, 2.97).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 108x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{6xy} dx dy; D : x = 0, y = 2, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \sqrt{25 - x^2}, y = 5 - \sqrt{25 - x^2}.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (6x + 2y) dx dy dz; V : z = 4x^2 + 9y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \cos(6xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 3, y = 4x, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4\sqrt{2}x = 0, z = x^2 + y^2 - 16, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 62

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 - y^2 + 8x - 8y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 4x^3 - 5y^3 - 6z^3 - 3x^2y + 4x^2z + 2xy^2 + xz^2 - yz^2 - 3xyz,$$

$$A(-4, 5, 5), B(-4.03, 5.05, 5.05).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (4xy + 50x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \sin xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{3\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 128, 8y = -x^2 (y \leq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (x + 5y) dx dy dz; V : z = x^2 + 10y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \sin(5xy) dx dy dz; V : x = 2, y = 0, y = x, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 6\sqrt{2}y = 0, z = x^2 + y^2 - 36, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 63

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 + 2xy - 4y^2 - 16x + 34y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -x^3 4y^3 3z^3 + 3x^2 y + 4x^2 z + 2xy^2 - 4xz^2 - 5xyz,$$

$$A(4, -1, 4), B(4.02, -0.94, 4.06).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 50x^4 y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \cos xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{2}, y = \frac{1}{2x}, x = 9.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (16 + 32\sqrt{x}) dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \operatorname{sh}(xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 4, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 8\sqrt{2}x, z = x^2 + y^2 - 64, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 64

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 - y^2 + 2x - 2y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -x^3 - 4y^3 - 4z^3 - 2x^2y + 3x^2z - 6xy^2 - 3xz^2 - 4yz^2 - 2xyz,$$

$$A(3, -1, -4), B(3.05, -1.03, -3.98).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (64x^3y^3 + 144x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{\frac{xy}{6}} dx dy; D : x = 0, y = 3, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = 39 - y^2, x = -10y.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (5x + 5y) dx dy dz; V : z = 10x^2 + 10y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 \operatorname{ch}(6xy) dx dy dz; V : x = 3, y = 0, y = 4x, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, x^2 + y^2 = 8x, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, y = 0 (y \geq 0).$$

Вариант 65

1. Найти экстремум функции.

$$z = 2x^2 - 6xy + 5y^2 + 20x - 32y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -3x^3 2y^3 - z^3 + 2x^2 y + 4x^2 z + 3xy^2 - 3xz^2 - 4yz^2 - 6xyz,$$

$$A(-1, -2, -1), B(-1.04, -1.97, -1.01).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (4xy + 75x^4 y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \sin xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{3\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{2}{x}, y = 3e^x, y = 2, y = 3.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (6x^2 + 7z^2) dx dy dz; V : z = 2y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \operatorname{ch}(5xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 4, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}y, z = x^2 + y^2 - 4, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 66

1. Найти экстремум функции.

$$z = -3x^2 + 4xy - 5y^2 - 2x + 38y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^3y^3 - 6z^3 - x^2y + 2x^2z + 3xy^2 - 5xz^2 - 5xyz,$$

$$A(-5, 4, 1), B(-5.04, 4.01, 0.98).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (9x^2y^2 + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 e^{\frac{xy}{4}} dx dy; D : x = 0, y = 4, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{2}{x}, y = 3e^x, y = 2, y = 3.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (7x + y) dx dy dz; V : z = 3x^2 + 7y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 e^{3xy} dx dy dz; V : x = 3, y = 0, y = 2x, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4x, x^2 + y^2 = 8x, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, y = 0 (y \geq 0).$$

Вариант 67

1. Найти экстремум функции.

$$z = -2x^2 - 2xy - 2y^2 - 18x - 24y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 4x^3 3z^3 - 5x^2 y - 5x^2 z - 6xy^2 + 4xz^2 - 5yz^2 - 6xyz,$$

$$A(2, 4, -5), B(1.99, 4.06, -5.02).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (27x^2 y^2 + 32x^3 y^3) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 e^{6xy} dx dy; D : x = 0, y = 3, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 12 - x^2, y = -4x.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (9 + 18\sqrt{z}) dx dy dz; V : y = 4x, y = 0, x = 2, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \operatorname{sh}(3xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4\sqrt{2}y = 0, z = x^2 + y^2 - 16, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 68

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 - 2xy - 4y^2 + 12x + 36y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -2x^3 - 3y^3 - 2z^3 - 2x^2y + 4xy^2 + xz^2 - 6yz^2 - 3xyz,$$

$$A(-4, -6, 3), B(-4.02, -5.97, 2.95).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16x^3y^3 + 144x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \sin \frac{xy}{4} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 18, 3x = -y^2 (x \leq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2yz dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 3, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \cos(xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 3, y = 0, y = 3, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4x = 0, z = 14 - x^2, z = 0.$$

Вариант 69

1. Найти экстремум функции.

$$z = -4x^2 - 6xy - 4y^2 + 38x + 32y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 2x^3y^3 - 3z^3 + 4x^2y + 2xy^2 + 4xz^2 - 6yz^2 - 2xyz,$$

$$A(-4, -1, -1), B(-4.02, -0.98, -0.99).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16x^3y^3 + 144x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{xy} dx dy; D : x = 0, y = 3, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{3}{x}, y = 5e^x, y = 3, y = 5.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z dx dy dz; V : y = 34x, y = 0, x = 1, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \operatorname{ch}(6xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 4, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6\sqrt{2}x, z = x^2 + y^2 - 36, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 70

1. Найти экстремум функции.

$$z = -2x^2 + 4xy - 3y^2 + 8x - 4y + 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -4x^3 - 2y^3z^3 + 2x^2y - 4x^2z + 2xy^2 + 4xz^2 - 5yz^2 - 6xyz,$$

$$A(1, -1, -3), B(0.97, -1.05, -2.99).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 9x^2y^2) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y \cos \frac{xy}{6} dx dy; D : y = 2\pi, y = 5\pi, x = 4, x = 8.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = 1\sqrt{x}, y = \frac{1}{x}, x = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{7})^3}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{7} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 \operatorname{sh}(4xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 2, y = 2x, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 5y, x^2 + y^2 = 7y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 71

1. Найти экстремум функции.

$$z = 4x^2 + 6xy + 4y^2 + 4x - 4y - 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^3 - 4y^3 - 2z^3 - 3x^2y - 6xy^2 + yz^2 + 2xyz,$$

$$A(-2, 1, -3), B(-1.96, 0.94, -3.02).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 72x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y \cos xy dx dy; D : y = 2\pi, y = 3\pi, x = 4, x = 7.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 2, 1y = -x^2 (y \leq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (3x + 5y) dx dy dz; V : z = 2x^2 + 2y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 z \cos(xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 3, y = 0, y = 1, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6y, x^2 + y^2 = 11y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 72

1. Найти экстремум функции.

$$z = 4x^2 - 2xy + y^2 + 36x - 6y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 - y^3 - 2z^3 - 2x^2y + 3x^2z + 4xy^2 + 4xz^2 + 4xyz,$$

$$A(-3, -6, 5), B(-2.95, -6.06, 4.97).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (4xy + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 e^{xy} dx dy; D : x = 0, y = 3, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{5}, y = \frac{1}{5x}, x = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 dx dy dz; V : y = 22x, y = 0, x = 3, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \sin(xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 2, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 8\sqrt{2}x, z = x^2 + y^2 - 64, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 73

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 + 2xy - 3y^2 - 14x + 30y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 2x^3 - 3y^3 + 2x^2y - 5x^2z + 4xy^2 + 3xz^2 + 3yz^2 + 4xyz,$$

$$A(-2, -2, 0), B(-2.05, -2.06, -0.05).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 64x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y \sin 4xy dx dy; D : y = 3\pi, y = 7\pi, x = 4, x = 8.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{3}{x}, y = 6e^x, y = 3, y = 6.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{4} + \frac{y}{7} + \frac{z}{5})^4}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{4} + \frac{y}{7} + \frac{z}{5} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \sin(4xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4x, z = \frac{17}{4} - y^2, z = 0.$$

Вариант 74

1. Найти экстремум функции.

$$z = -3x^2 + 6xy - 5y^2 - 18x + 22y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -6x^3 - 6y^3 - 4z^3 - 5x^2y - x^2z + xy^2 + 3xz^2 - 4yz^2 + 2xyz,$$

$$A(-4, -2, -2), B(-4.06, -2.04, -2.06).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 18x^2y^2) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \cos 4xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{3\pi}, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{3}, y = \frac{1}{3x}, x = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2xy^2 dx dy dz; V : y = 5x, y = 0, x = 2, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \sin(6xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 3, y = 3x, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4x = 0, z = \frac{5}{4} - x^2, z = 0.$$

Вариант 75

1. Найти экстремум функции.

$$z = 3x^2 + 4xy + 5y^2 - 16x - 40y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 - 5y^3 - 2z^3 + 2x^2y - 2x^2z - 3xy^2 - 6xz^2 + 2yz^2,$$

$$A(2, -4, -3), B(1.95, -3.98, -3.06).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (32x^3y^3 + 36x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \sin xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \sqrt{9 - x^2}, y = 3 - \sqrt{9 - x^2}.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{9} + \frac{y}{5} + \frac{z}{5})^6}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{9} + \frac{y}{5} + \frac{z}{5} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z \operatorname{ch}(6xyz) dxdydz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 1, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 6\sqrt{2}x = 0, z = x^2 + y^2 - 36, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 76

1. Найти экстремум функции.

$$z = -2x^2 + 4xy - 5y^2 + 4x + 20y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 4y^3 3z^3 - 5x^2 y - 4x^2 z - 3xy^2 - 3xz^2 - yz^2 - 2xyz,$$

$$A(6, -4, -2), B(6.05, -3.96, -1.94).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (18x^2 y^2 + 50x^4 y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \cos 6xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{1}{x}, y = 3e^x, y = 1, y = 3.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (3x^2 + y^2) dx dy dz; V : z = 2x + 9y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z \operatorname{sh}(2xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 3, y = 0, y = 4, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 8\sqrt{2}x, z = x^2 + y^2 - 64, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 77

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 - 2xy - 3y^2 - 30x + 22y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 2x^3y^3 - 3z^3 + 3x^2z + 4xy^2 + 2xz^2 - 3yz^2 - 4xyz,$$

$$A(-4, -2, 4), B(-4.01, -2.02, 4.06).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (32x^3y^3 + 144x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y^2 \sin xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{3\pi}, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{5}, y = \frac{1}{5x}, x = 16.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (25 + 50\sqrt{y}) dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 \sin(xy) dx dy dz; V : x = 4, y = 0, y = 3x, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2y, x^2 + y^2 = 6y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 78

1. Найти экстремум функции.

$$z = 2x^2 - 6xy + 5y^2 + 30x - 48y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -4x^32y^3 - z^3 - 4x^2y + 3xz^2 + yz^2 + xyz,$$

$$A(-6, 6, 4), B(-6.01, 5.97, 3.99).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (36x^2y^2 + 108x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 e^{4xy} dx dy; D : x = 0, y = 4, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{121 - y^2}, x = 11 - \sqrt{121 - y^2}, y = 0 (y \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (4y^2 + 3z^2) dx dy dz; V : z = 10x, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z e^{6xyz} dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 4, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 8\sqrt{2}x, z = x^2 + y^2 - 64, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 79

1. Найти экстремум функции.

$$z = -2x^2 - 2xy - y^2 + 14x + 4y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 - 4y^3 - 6z^3 - 4x^2z - xy^2 + 3xz^2 - 3yz^2,$$

$$A(-4, -2, -4), B(-3.95, -1.98, -3.96).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (4xy + 100x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 \cos 6xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{144 - y^2}, x = 12 - \sqrt{144 - y^2}.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (3x^2 + 4y^2) dx dy dz; V : z = 2x, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \sin(3xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 2, y = x, z = 0, z = \pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4x = 0, z = \frac{17}{4} - x^2, z = 0.$$

Вариант 80

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 - 2xy - 2y^2 - 14x - 20y + 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3y^3z^3 - 6x^2y - 6x^2z + 4xy^2 + 2xz^2 - 5yz^2 - xyz,$$

$$A(-1, -5, 2), B(-1.03, -4.97, 1.97).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 72x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 e^{6xy} dx dy; D : x = 0, y = 4, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = 9 - y^2, x = -8y.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2z^2 dx dy dz; V : y = 35x, y = 0, x = 3, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 z \operatorname{sh}(2xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 2, y = 0, y = 3, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 2x = 0, z = 8 - y^2, z = 0.$$

Вариант 81

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 + y^2 + 4x + 10y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^3 - 4z^3 + 3x^2y - 3xy^2 + 3xz^2 - 4yz^2 + 2xyz,$$

$$A(-1, 0, -6), B(-1.01, -0.05, -5.99).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (27x^2y^2 + 100x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y \sin xy dx dy; D : y = \pi, y = 5\pi, x = 2, x = 4.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = 55 - y^2, x = -6y.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (49 + 98x^3) dx dy dz; V : y = 9x, y = 0, x = 1, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \operatorname{sh}(5xy) dx dy dz; V : x = 4, y = 0, y = 2x, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 5y, x^2 + y^2 = 8y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 82

1. Найти экстремум функции.

$$z = 4x^2 + 2xy + 2y^2 - 6x + 2y + 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -3x^3 - 3y^3 - z^3 - 3x^2y + 4xy^2 - xz^2 - 5xyz,$$

$$A(2, -4, 4), B(2.05, -4.04, 4.04).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (36x^2y^2 + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \cos xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \sqrt{16 - x^2}, y = 4 - \sqrt{16 - x^2}, x = 0 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 z dx dy dz; V : y = 11x, y = 0, x = 2, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \cos(6xy) dx dy dz; V : x = 1, y = 0, y = 2x, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 3x, x^2 + y^2 = 7x, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, y = 0 (y \geq 0).$$

Вариант 83

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 + 6xy - 2y^2 + 14x - 8y - 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -2x^3 - 5y^3 - 5z^3 + 4x^2y - 5x^2z - 2xy^2 - 2xz^2 + yz^2 + 2xyz,$$

$$A(-5, -3, 5), B(-5.04, -3.04, 5.01).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16xy + 108x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 \cos 6xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{2}{x}, y = 3e^x, y = 2, y = 3.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 3dxdydz; V : y = 26x, y = 0, x = 1, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \cos(2xy) dxdydz; V : x = 0, y = 3, y = 3x, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4x, z = 14 - y^2, z = 0.$$

Вариант 84

1. Найти экстремум функции.

$$z = 5x^2 - 8xy + 4y^2 + 18x - 16y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^3 - 3y^3 - 2z^3 + 4x^2y - 4x^2z + 3xy^2 + 4yz^2 + xyz,$$

$$A(-6, 4, -6), B(-6.05, 3.94, -6.01).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 9x^2y^2) dxdy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y \sin \frac{xy}{6} dxdy; D : y = 3\pi, y = 7\pi, x = 4, x = 6.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \sqrt{81 - x^2}, y = 9 - \sqrt{81 - x^2}, x = 0 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{2} + \frac{y}{8} + \frac{z}{4})^6}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{2} + \frac{y}{8} + \frac{z}{4} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \operatorname{sh}(6xy) dxdydz; V : x = 0, y = 2, y = 3x, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 4x, z = 6 - y^2, z = 0.$$

Вариант 85

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 - 2xy + 3y^2 - 2x + 6y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^3 - 5z^3 - x^2z - xy^2 + 2xz^2 - 6yz^2 - 4xyz,$$

$$A(0, -1, -6), B(-0.02, -1.05, -6.06).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 32x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12ye^{6xy} dx dy; D : y = \ln 4, y = \ln 7, x = 3, x = 7.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{144 - y^2}, x = 12 - \sqrt{144 - y^2}.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (36 + 72\sqrt{y}) dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 2, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 e^{3xy} dx dy dz; V : x = 2, y = 0, y = x, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6\sqrt{2}x, z = x^2 + y^2 - 36, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 86

1. Найти экстремум функции.

$$z = 5x^2 - 8xy + 4y^2 + 16x - 16y + 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 - y^3 - 2x^2y + 2x^2z + 2xy^2 + 4xz^2 - 3yz^2 - xyz,$$

$$A(5, -2, -4), B(5.05, -1.99, -4.06).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 18x^2y^2) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 \sin xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{36 - y^2}, x = 6 - \sqrt{36 - y^2}, y = 0 (y \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{8} + \frac{y}{2} + \frac{z}{8})^5}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{8} + \frac{y}{2} + \frac{z}{8} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2z \operatorname{ch}(4xyz) dxdydz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 4, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6\sqrt{2}x, z = x^2 + y^2 - 36, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 87

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 + 4xy + 5y^2 + 14x + 34y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -4x^3 - 2y^3 - 4z^3 + 2x^2y - x^2z - 4xy^2 - 4xz^2 + 4yz^2 - 6xyz,$$

$$A(-3, -2, 5), B(-2.95, -2.03, 4.95).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (4xy + 48x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D y \sin 4xy dx dy; D : y = 3\pi, y = 5\pi, x = 1, x = 3.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{25 - y^2}, x = 5 - \sqrt{25 - y^2}.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{3} + \frac{y}{7} + \frac{z}{3})^4}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{3} + \frac{y}{7} + \frac{z}{3} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 \operatorname{sh}(6xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 3, y = 3x, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, z = 12 - y^2, z = 0.$$

Вариант 88

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 + 2xy - 3y^2 - 20x + 32y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 2x^3 - 4y^3 + 4z^3 + x^2y - x^2z + 3xy^2 + xz^2 - 2yz^2 - 6xyz,$$

$$A(0, -5, -6), B(-0.01, -4.96, -5.98).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (9x^2y^2 + 48x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12ye^{\frac{xy}{6}} dx dy; D : y = \ln 4, y = \ln 8, x = 4, x = 8.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{2}{x}, y = 4e^x, y = 2, y = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (5x + 4y) dx dy dz; V : z = 2x^2 + 8y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \sin(3xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 4, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, z = \frac{21}{4} - y^2, z = 0.$$

Вариант 89

1. Найти экстремум функции.

$$z = 4x^2 - 8xy + 5y^2 - 48x + 56y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 - 2y^3 - 4z^3 + x^2y - 3x^2z - 3xy^2 + 4xz^2 + yz^2 - 2xyz,$$

$$A(5, 0, -4), B(5.03, -0.02, -3.98).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16xy + 9x^2y^2) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y \cos 6xy dx dy; D : y = \pi, y = 5\pi, x = 3, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 50, 5x = y^2 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V xyz dx dy dz; V : y = 20x, y = 0, x = 3, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 z \sin(4xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 3, y = 0, y = 1, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2y, x^2 + y^2 = 5y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 90

1. Найти экстремум функции.

$$z = 5x^2 + 2xy + 2y^2 + 14x - 8y - 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -3x^3y^3z^3 - 4x^2y + 4x^2z + 2xy^2 - 3xz^2 - 3yz^2 - 2xyz,$$

$$A(4, -1, 3), B(3.98, -0.95, 3.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 48x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y \cos 6xy dx dy; D : y = 2\pi, y = 4\pi, x = 1, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = 20 - y^2, x = -8y.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (6y^2 + 5z^2) dx dy dz; V : z = x, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 \operatorname{sh}(xy) dx dy dz; V : x = 3, y = 0, y = 4x, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 2x = 0, z = 6 - x^2, z = 0.$$

Вариант 91

1. Найти экстремум функции.

$$z = -3x^2 - 2xy - 2y^2 + 4x - 2y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^3 - 5y^3 - 3z^3 - 3x^2y - x^2z - 4xy^2 - 5xz^2 + 2yz^2 + 2xyz,$$

$$A(-4, -6, 2), B(-3.97, -6.01, 1.95).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (48x^3y^3 + 72x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \sin \frac{xy}{6} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x = \sqrt{9 - y^2}, x = 3 - \sqrt{9 - y^2}.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (3x + 4y) dx dy dz; V : z = 2x^2 + 4y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 z e^{3xyz} dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 1, z = 0, z = 3.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6x, z = 14 - x^2, z = 0.$$

Вариант 92

1. Найти экстремум функции.

$$z = -x^2 - 4xy - 5y^2 + 10x + 26y - 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = 3x^34y^3 - 5z^3 + 4x^2y + 3x^2z + 4xy^2 + 2xz^2 - 4yz^2 - 5xyz,$$

$$A(4, -4, -5), B(4.02, -3.96, -4.96).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (36x^2y^2 + 25x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \cos 4xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{2\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{2}{x}, y = 4e^x, y = 2, y = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (5x + y) dx dy dz; V : z = 3x^2 + 6y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2x^2 \operatorname{ch}(xy) dx dy dz; V : x = 2, y = 0, y = 4x, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 5x, x^2 + y^2 = 7x, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, y = 0 (y \leq 0).$$

Вариант 93

1. Найти экстремум функции.

$$z = -3x^2 - 2xy - 4y^2 + 20x + 14y + 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = x^3 - y^3 - z^3 - 6x^2z - 4xy^2 + xz^2 - yz^2 - 3xyz,$$

$$A(-4, 4, -4), B(-4.06, 4.04, -3.99).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (18x^2y^2 + 75x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \cos xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{3\pi}, y = 2x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 72, 6y = x^2 (y \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (4x + 5y) dx dy dz; V : z = 7x^2 + 9y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \cos(4xy) dx dy dz; V : x = 2, y = 0, y = 4x, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 6x = 0, z = 10 - x^2, z = 0.$$

Вариант 94

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 + 2xy - 2y^2 - 28x + 2y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -6x^32y^3 - 6z^3 + x^2y - 2x^2z - 2xy^2 - xz^2 - 4yz^2 + 2xyz,$$

$$A(-5, 1, -2), B(-5.04, 0.97, -2.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (27x^2y^2 + 48x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 \sin xy dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{3\pi}, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \sqrt{36 - x^2}, y = 6 - \sqrt{36 - x^2}, x = 0 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (4x^2 + 3y^2) dx dy dz; V : z = 9x, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 z e^{4xyz} dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 4, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 2\sqrt{2}y = 0, z = x^2 + y^2 - 4, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 95

1. Найти экстремум функции.

$$z = 3x^2 + 4xy + 2y^2 - 2x - 4y + 1.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -4x^3y^3 - 4z^3 + x^2y - 3xy^2 - 5xz^2 + yz^2 - 6xyz,$$

$$A(1, 1, 5), B(0.99, 1.05, 4.94).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (12xy + 25x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y \cos \frac{xy}{6} dx dy; D : y = 3\pi, y = 5\pi, x = 1, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{1}{x}, y = 4e^x, y = 1, y = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (16 + 32\sqrt{z}) dx dy dz; V : y = x, y = 0, x = 2, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z \cos(2xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 1, y = 0, y = 4, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}y, z = x^2 + y^2 - 4, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 96

1. Найти экстремум функции.

$$z = -2x^2 - 2xy - 2y^2 - 20x - 22y - 2.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -2x^3 - 5y^3 - 5z^3 + 4x^2y - 6x^2z - 4xy^2 + 4xz^2 + 3yz^2 - 4xyz,$$

$$A(-2, -3, 1), B(-1.98, -2.95, 0.98).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16xy + 9x^2y^2) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y \sin \frac{xy}{6} dx dy; D : y = 2\pi, y = 4\pi, x = 2, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{2}{x}, y = 3e^x, y = 2, y = 3.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (8x + 4y) dx dy dz; V : z = 5x^2 + 2y^2, y = x, x = 1, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V x^2 \sin(3xy) dx dy dz; V : x = 3, y = 0, y = 2x, z = 0, z = 3\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 3y, x^2 + y^2 = 5y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 97

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 - 2xy + 4y^2 + 14x - 44y + 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -4x^3 4y^3 - 4z^3 - 3x^2 y - 4x^2 z + 2xy^2 + yz^2 - 2xyz,$$

$$A(-3, -4, 1), B(-3.01, -4.01, 0.94).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (16xy + 9x^2 y^2) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -x^3.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y^2 e^{\frac{xy}{6}} dx dy; D : x = 0, y = 4, y = x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{2}, y = \frac{1}{2x}, x = 16.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V \frac{dxdydz}{(1 + \frac{x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2})^5}; V : x = 0, y = 0, z = 0, \frac{x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = 1.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V y^2 \cos(6xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 4, y = x, z = 0, z = 4\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6y, x^2 + y^2 = 9y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 98

1. Найти экстремум функции.

$$z = 3x^2 - 4xy + 3y^2 - 2x + 8y - 3.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -2x^3y^3z^3 - x^2y - 4x^2z + 3xy^2 - 4yz^2,$$

$$A(0, -4, 6), B(0.04, -3.97, 6.02).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (8xy + 100x^4y^4) dx dy; D : x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12ye^{xy} dx dy; D : y = \ln 3, y = \ln 7, x = 1, x = 3.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{\sqrt{x}}{5}, y = \frac{1}{5x}, x = 4.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V z dx dy dz; V : y = 26x, y = 0, x = 1, z = xy, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 e^{5xy} dx dy dz; V : x = 0, y = 4, y = x, z = 0, z = 1.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 + 4\sqrt{2}x = 0, z = x^2 + y^2 - 16, z = 0 (z \geq 0).$$

Вариант 99

1. Найти экстремум функции.

$$z = x^2 + y^2 + 4x - 6y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -6x^3 - y^3 - 3z^3 - 2x^2y + 4x^2z + 3xy^2 + 4xz^2 + 4xyz,$$

$$A(-1, -1, 0), B(-1.05, -0.96, 0.03).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (9x^2y^2 + 36x^5y^5) dx dy; D : x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 12y^2 \cos \frac{xy}{4} dx dy; D : x = 0, y = \sqrt{3\pi}, y = 3x.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$x^2 + y^2 = 72, 6x = y^2 (x \geq 0).$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (8x^2 + y^2) dx dy dz; V : z = 6x + 4y, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 \operatorname{ch}(4xy) dx dy dz; V : x = 0, y = 3, y = 3x, z = 0, z = 2.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 6y, x^2 + y^2 = 9y, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0.$$

Вариант 100

1. Найти экстремум функции.

$$z = -5x^2 - 2xy - y^2 + 6x + 6y - 4.$$

2. Даны функция $u = f(x, y, z)$ и точки $A(x_0; y_0; z_0)$ и $B(x_1; y_1; z_1)$. Требуется:

- вычислить значение u_1 функции в точке B ;
- вычислить приближенное значение u_1 функции в точке B , исходя из значения u_0 функции в точке A , заменив приращение функции при переходе от точки A к точке B дифференциалом, и оценить в процентах относительную погрешность, возникающую при замене приращения функции ее дифференциалом.

$$u = -4x^3 - 5z^3 + x^2y + x^2z + 4xy^2 + 3xz^2 - 6yz^2 + 2xyz,$$

$$A(-4, -6, 4), B(-4.02, -5.95, 3.97).$$

3. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D (18x^2y^2 + 48x^3y^3) dx dy; D : x = 1, y = x^2, y = -\sqrt{x}.$$

4. Вычислить двойной интеграл:

$$\iint_D 8y \cos xy dx dy; D : y = \pi, y = 4\pi, x = 2, x = 5.$$

5. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями.

$$y = \frac{3}{x}, y = 5e^x, y = 3, y = 5.$$

6. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V (36 + 72\sqrt{y}) dx dy dz; V : y = 4x, y = 0, x = 2, z = \sqrt{xy}, z = 0.$$

7. Вычислить тройной интеграл:

$$\iiint_V 2y^2 z \cos(2xyz) dx dy dz; V : x = 0, x = 4, y = 0, y = 1, z = 0, z = 2\pi.$$

8. Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$x^2 + y^2 = 5x, x^2 + y^2 = 10x, z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 0, y = 0 (y \leq 0).$$